



Formosan Entomologist

Journal Homepage: entsocjournal.yabee.com.tw

【Review article】

臺灣產天牛科目錄 (II)粗天牛亞科【綜合論述】

楨原 寬、齊藤明子、朱耀沂、林 匡夫、中村慎吾

*通訊作者E-mail :

Received: Accepted: 1988/02/20 Available online: 1989/03/01

Abstract

摘要

本篇中列出臺灣產天牛科、大牛亞科之種類共311種。

Key words:

關鍵詞:

Full Text:  [PDF\(2.15 MB\)](#)

下載其它卷期全文 Browse all articles in archive: <http://entsocjournal.yabee.com.tw>

A LIST OF CERAMBYCID-BEETLES FROM TAIWAN (II)⁽¹⁾

Subfamily Lamiinae

Shingo Nakamura⁽²⁾, Hiroshi Makihara⁽³⁾, Akiko Saito⁽⁴⁾,

Yau-I Chu⁽⁵⁾ and Masuo Hayashi⁽⁶⁾

(Accepted for publication February 20, 1988)

Till present, 311 species of Cerambycid beetles which belong to subfamily Lamiinae are recorded from Taiwan. They are listed in the following catalogue:

Subfamily Lamiinae 粗天牛亞科

Tribe Mesosini 星斑天牛族

Genus *Mesoereis* MATSUSHITA, 1933 大星斑天牛屬

Mesoereis MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 338 (Type-species: *M. koshunensis* MATSUSHITA, 1933).

Mesoereis koshunensis MATSUSHITA, 1933 恆春大星斑天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 339, pl. 5, f. 6 (Koshun).

Distr.: Taiwan.

M. obscurus MATSUSHITA, 1933 黃翅大星斑天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 339, pl. 5, f. 5 (Hori).

Distr.: Taiwan.

Genus *Falsomesosella* PIC, 1925 偽星斑天牛屬

Falsomesosella PIC, 1925, Mel. Exot.-Ent., 44: 27 (Type-species: *F. albofasciata* PIC, 1925).

(1) During the course of the present work, the authors debted for the co-operation on the following colleague to whom our sincerely thanks are due, Drs. T. Niisato, N. Obayashi, T. Shimomura and Miss M. J. Lin. Also this work is financially supported by National Science Council, R. O. C. under the project No. of NSC 75-0409-B002-47.

(2) 179 Setoyama, Moto-machi, Shobara, Hiroshima, Japan.

(3) Sect. Forest Entomology, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan.

(4) Div. of Entomology, National Institute of Agro-Environmental Sciences, Japan.

(5) Dept. of Plant Pathology and Entomology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, R. O. C.

(6) Osaka Jonan Women's Junior College, Japan.

Falsomesosella horishana GRESSITT, 1938 埔里姬星斑天牛

GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 161, pl. 1, f. 9 (Hori).

Distr.: Taiwan.

F. subalba GRESSITT, 1938 白姬星斑天牛

GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 162, pl. 1, f. 10 (Kuraru).

Distr.: Taiwan.

Genus *Mesosa* LATREILLE, 1829 星斑天牛屬

Mesosa LATREILLE, 1829, in Cuvier, Regne Anim. Ins. 2: 124 (Type-species: *Lamia cruculionoides* LINNE, 1761).

Subgenus *Mesosa* LATREILLE, 1829, s. str.

Mesosa (Mesosa) perplexa PASCOE, 1858 褐翅星斑天牛

PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 243 (N. China).

alternans SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 62 (*Saimia*) (Kankau, Kosempo, Pilam).

?*formosana* PIC, 1925, Mel. Exot.-Ent., 44: 30 (?*Mimocoptops*) (Taiwan).

Distr.: Taiwan; Japan, E. China.

Subgenus *Aphelocnemia* STEPHENS, 1831

Aphelocnemia STEPHENS, 1831, Brit. Ent. Man. Errata, p. 414 (Type-species: *Lamia nebulosa* FABRICIUS, 1781).

Mesosa AURIVILLIUS, 1922, Coleop. Cat., (73): 137 (nec LATREILLE, 1829).

Helixoea PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 124 (Type-species: *Agelasta rupta* PASCOE, 1862).

Haplocnemia GEMMINGER et HAROLD, 1873, Cat. Col., 10: 3038.

M. (Aphelocnemia) latifasciata (WHITE, 1858) 寬帶星斑天牛

WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, 26: 401 (*Cacia*) (Shanghai).

luteopubens PIC, 1917, Mel. Exot.-Ent., 23: 7 (Tonkin).

Distr.: Taiwan; E. China, Tonkin.

Subgenus *Perimesosa* BREUNING, 1939

Mesosa subgen. *Perimesosa* BREUNING, 1939, Novit. Ent., 9, suppl. 3, fasc. (52): 409 (Type-species: *Mesosa hirsuta* BATES, 1884).

M. (Perimesosa) atrostigma GRESSITT, 1942 黑點星斑天牛

GRESSITT, 1942, Notes d'Ent. Chinoise, 9: 84, pl. 1, f. 4 (China).

Distr.: Taiwan; E. China.

M. (P.) binigrovittata BREUNING, 1942 雙點星斑天牛

BREUNING, 1942, Novit. Ent., 11-12: 143 (Hokuzanko).

Distr.: Taiwan.

M. (P.) chassoti BREUNING, 1970 夏叟氏星斑天牛

BREUNING 1970, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, p. 89 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Saimia* PASCOE, 1866

Saimia PASCOE, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 234 (Type-species: *Saimia albidorsalis* PASCOE, 1864).

Pachyosa FAIRMAIRE, 1897, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 71 (Type-species: *Pachyosa cervinopicta* FAIRMAIRE, 1897).

M. (Saimia) kojimai (HAYASHI, 1974) 小島氏星斑天牛
HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 37 (*Coptops*) (Liukuei).
Distr.: Taiwan.

M. (S.) kuntzeni MATSUSHITA, 1933 臺灣白條星斑天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ. 34: 342 (Hozan).
Distr.: Taiwan.

Genus *Cacia* NEWMAN, 1842 鬚角星斑天牛屬

Cacia NEWMAN, 1842, Entomol. 1: 290 (Type-species: *C. spinigera* NEWMAN, 1842).

Subgenus *Ipocregyes* PASCOE, 1866

Ipocregyes PASCOE, 1866, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 113 (Type-species: *I. newmanni* PASCOE, 1866).

Cacia (Ipocregyes) arisana (KANO, 1933) 阿里山刷角星斑天牛
KANO, 1933, Kontyû, 6: 281 (*Ipocregyes arisanus*) (Arisan).
scopiferus MITONO, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 24: 492 (*Cenodocus*) (Hassenzan).
Distr.: Taiwan.

C. (I.) formosana (SCHWARZER, 1925) 蓬萊星斑天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 60 (*Mesosa*) (Hozan).
Distr.: Taiwan; E. China.

C. (I.) watantakkuni (KANO, 1933) 鬚角星斑天牛
KANO, 1933, Kontyû, 6: 280 (Nankotaizan).
Distr.: Taiwan.

Subgenus *Corethrophora* BLANCHARD, 1853

Corethrophora BLANCHARD, 1853, Voy. Pole Sud. Zool., 4: 301 (Type-species: *C. semiluctuosa* BLANCHARD, 1853).

C. (Corethrophora) shirupiti KANO, 1939 蘭嶼纓角星斑天牛
KANO, 1939, Annot. Zool. Jap., 18: 31, pl. 2, f. 4 (Lanyu I).
Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Agelasta* NEWMAN, 1842 棋斑天牛屬

Agelasta NEWMAN, 1842, Entomol., 1: 269 (Type-species: *A. transversa* NEWMAN, 1842).

Subgenus *Dissosira* PASCOE, 1865

Dissosira PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 124, note (Type-species: *Agelasta catenata* PASCOE, 1862)

Agelasta (Dissosira) cana BREUNING, 1939 大坂棋斑天牛
BREUNING, 1939, Novit. Ent., 9, suppl. 3: 520 (Taihanroku).
Distr.: Taiwan.

A. (D.) tonkinea PIC, 1925
PIC, 1925, Bull. Soc. Ent. France, p. 188 (Tonkin).

formosana SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 61 (Fuhosho et Kosempo).

Distr.: Taiwan; W. China, Hainan I., Assam, Laos, Tonkin.

subsp. *tonkinea* PIC, 1925, s. str. 吹粉棋斑天牛

PIC, 1925, Bull. Soc. Ent. France, p. 188 (Tonkin).

Distr.: Taiwan; Assam, Laos, Tonkin.

Subgenus *Parasaimia* BREUNING, 1935

Parasaimia BREUNING, 1935, Fol. Zool. Hydrobiol., 8: 267 (Type-species: *Mimocoptops laosensis* PIC, 1925).

A. (*Parasaimia*) *hirticornis* (GRESSITT, 1936) 毛角星斑天牛

GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 102, pl. 1, f. 13 (*Saimia*?) (Hassenzan).

Distr.: Taiwan.

Genus *Mutatocoptops* PIC, 1923 小笠原星天牛屬

Mutatocoptops PIC, 1923, Mel. Exot.-Ent., 44: 29 (Type-species: *M. alboapicalis* PIC, 1925).

Saimia subgen. *Paracoptops* HELLER, 1926, Tijdschr. Ent., 69: 36 (Type-species: *Saimia (Paracoptops) tuberosa* HELLER, 1926 = *Saimia bituberosa* PASCOE, 1866).

Mutatocoptops anancyloides (SCHWARZER, 1925) 灰紋星斑天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 61 (*Coptops*) (Hozan).

Distr.: Taiwan; Laos.

Tribe Homonoieini 淡色燦天牛族

Genus *Micromulciber* AURIVILLIUS, 1913 四條天牛屬

Micromulciber AURIVILLIUS, 1913, Ark. Zool., 8, 22: 25 (Types-species: *Mulciber biguttatus* PASCOE, 1867)

Kamikiria MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ., 34(2): 348 (Xylorhizini) (Type-species: *Kamikiria plagiata* MATSUSHITA, 1933 = *Micromulciber 4-signatus* SCHWARZER, 1925).

Micromulciber quadrisignatus SCHWARZER, 1925 白星偽叉尾天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 64 (Sokutsu).

plagiata MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 349, pl. 4, f. 5 (Koshun, Kuraru).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

Genus *Bumetopia* PASCOE, 1858 淡色燦天牛屬

Bumetopia PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 252 (Type-species: *B. oscitans* PASCOE, 1858).

Bumetopia oscitans PASCOE, 1858 蘭嶼燦天牛

PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 252, pl. 26, f. 7 (Hong Kong).

Distr.: Taiwan; Japan, S. China.

B. *lanshuana* HAYASHI, 1974 蘭嶼淡色燦天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 40 (Lanyu Is.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

B. lutaoana HAYASHI, 1974 綠島淡色燦天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 41 (Lutau I.).

Distr.: Taiwan (Lutau I.).

B. stolata (MATSUSHITA, 1931) 蘭嶼超扁條天牛MATSUSHITA, 1931, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., 12: 45, f. 2 (*Tmesisternus*) (Lanyu I.).*tobacoximae* KANO, 1931, Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 2: 185, pl. 16, f. 2 (*Homonoëa*) (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I., Lutau I.).

Tribe Apomecynini 白星鏽天牛族

Genus *Apomecyna* LATREILLE, 1829 白星鏽天牛屬*Apomecyna* LATREILLE, 1829, in Cuvier, Regne Anim., ed. 2, 5: 126 (Type-species: *Lamia alboguttata* MEGERLE, 1802).*Apomecyna naevia* BATES, 1873 黃斑細鏽天牛

BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 317 (Japan).

Distr.: Taiwan(?); Japan.

A. historio (FABRICIUS, 1792) 胸紋鏽天牛FABRICIUS, 1792, Ent. Syst., 1(2): 288 (*Lamia*) (India).*alboguttata* MEGERIE, 1802, Cat. Ins. Append. Nov., 473: 10 (*Saperda*).*quadrifasciata* THOMSON, 1868, Physis., 2: 59.*maculaticollis* PIC, 1918, Mel. Exot-Ent., 28: 6.

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), Korea, Hainan I., Philippines, Indonesia, India, Laos.

A. saltator (FABRICIUS, 1781) 香瓜鏽天牛FABRICIUS, 1781, Mant. Ins., 1: 141 (*Lamia*).*neglecta* PASCOE, 1865, Mant. Ins., 1: 152.*pertigera* THOMSON, 1868, Physis, 2: 160.*multinotata* PIC, 1918, Mel. Exot-Ent., 28: 5.*cantator excavaticeps* GRESSITT, 1942, Philip. J. Sci., 72: 161, pl. 4, f. 9-10 (Hainan I.).*excavaticeps*: GRESSITT, 1942, Lingn. Nat. Hist. Surv. Mus. Spec. Publ., 8: 25.

Distr.: SE Asia.

Genus *Ropica* PASCOE, 1858 雙星鏽天牛屬*Ropica* PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 247 (Type-species: *R. piperata* PASCOE, 1858).*Ropica dorsalis* SCHWARZER, 1925 雙星鏽天牛SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 145 (*R. formosana* var. *dorsalis*) (Taihorin, Sokutsu et Kankau).

Distr.: Taiwan; Hainan I., S. China, Hong Kong.

- R. formosana* BATES, 1866 臺灣雙星銹天牛
BATES, 1866, Proc. Ent. Soc. London, p. 351 (Taiwan).
Distr.: Taiwan.
- R. fuscolaterimaculata* HAYASHI, 1974 蘭嶼綠紋銹天牛
HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 42 (Lanyu I.).
Distr.: Taiwan. (Lanyu I.).
- R. honesta* PASCOE, 1865 蘭嶼雙星銹天牛
PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 190 (New Guinea, Moluccas).
formosana BATES, var. *dorsalis* SCHWARZER, 1925, Ent. Bl. Biol. Syst. Kafer, 21(4):
145 (Taihorin, Kankau).
dorsalis: GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 491.
rufescens PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 46: 5 (Tonkin).
burketi GRESSITT, 1937, Lingn. J. Sci., 16: 609 (SE China).
langana PIC, 1945, Echange, 61(499): 3 (Tonkin).
Distr.: Taiwan (Lanyu I.); Japan, New Guinea, SE Asia.
- R. variabilis* SCHWARZER, 1925 雙紋銹天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 68 (*R. formosana* var.).
Distr.: Taiwan.

Genus *Iproca* GRESSITT, 1940 尖翅銹天牛屬

- Iproca* GRESSITT, 1940, Philip. J. Sci., 72: 165 (Type-species: *I. acuminata* GRESSITT, 1940).
- Iproca flavolineata* HAYASHI, 1971 黃條尖翅銹天牛
HAYASHI, 1971, Ent. Rev. Japan, 23(1): 10 (Shihmen Reservoir).
Distr.: Taiwan.

Genus *Microlera* BATES, 1873 菱天牛屬

- Microlera* BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 380 (Type-species: *M. ptinoides* BATES, 1873).
- Microlera kanoi* HAYASHI, 1971 鹿野氏菱天牛
HAYASHI, 1971, Ent. Rev. Japan, 23(1): 9 (Jujiro).
Distr.: Taiwan.

Genus *Asaperda* BATES, 1873 華夏黑斑天牛屬

- Asaperda* BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 385 (Type-species: *A. rufipes* BATES, 1873).
- Asaperda meridiana* MATSUSHITA, 1931 卓社黑斑天牛
MATSUSHITA, 1931, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., 12: 45 (Taihorin, Hozan et Hori).
takushaensis KANO, 1933, Kontyû, 6: 283 (Takusha).
Distr.: Taiwan; SE China.

Genus *Pseudokamikiria* TIPPMAN, 1942 偽叉尾天牛屬

Pseudokamikiria TIPPMAN, 1942, Keleop. Rund., 33: 124.

Pseudokamikiria gressitti (TIPPMAN, 1942) 克雷氏偽叉尾天牛
TIPPMAN, 1942, Koleop. Rund., 33: 124 (*Kamikiria*) (Musha).
Distr.: Taiwan.

Genus *Doliops* WATERHOUSE, 1841 偽硬象天牛屬

Doliops WATERHOUSE, 1841, Proc. Ent. Soc. London, p. 278, (Type-species: *D. curculionoides* WATERHOUSE, 1841).

Doliops similis MIWA et MITONO, 1933 偽硬象天牛

MIWA et MITONO, 1933, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 23: 373 (n. n. for *pachyrhynchoides* MIWA et MITONO, 1932).

pachyrhynchoides MIWA et MITONO (nec HELLER), 1932, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 22: 306, f. (*Aprophata*), (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Mimoplocia* BREUNING, 1949 黃紋細銹天牛屬

Mimoplocia BREUNING, 1949, Bull. Inst. Soc. Nat. Belg., 25, 38: 19 (Type-species: *Plocia notata* NEWMAN, 1842).

Mimoplocia notata (NEWMAN, 1842) 蘭嶼黃紋細銹天牛

NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 292 (*Plocia*) (Philippines).

albicornis HEYROVSKY, 1935, Cas. Cesk. Spol. Ent., 32: 19 (*Epaphra*).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.); Philippines.

Genus *Atimura* PASCOE, 1863 瘤條銹天牛屬

Atimura PASCOE, 1863, Trans. Ent. Soc. London, (3)1: 548 (Type-species: *A. terminata* PASCOE, 1863).

Atimura formosana MATSUSHITA, 1933 蓬萊筒型矮天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 371 (Shijukei).

Distr.: Taiwan.

A. fulva SCHWARZER, 1925 黃翅矮天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 145 (Kankau).

Distr.: Taiwan.

Genus *Xylariopsis* BATES, 1834 白領天牛屬

Xylariopsis BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 247 (Type-species: *X. mimica* BATES, 1884).

Xylariopsis esakii MITONO, 1943 江崎氏白領天牛

MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33: 582 (Hassenzan: Reimei).

Distr.: Taiwan.

Genus *Sybra* PASCOE, 1865 艷紋矮天牛屬

Sybra PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 141, 198 (Type-species: *Ropica*

- stigmatica* PASCOE, 1859).
- Sybra pascoei* LAMEERE, 1893
LAMEERE, 1893, Annl. Soc. Ent. Fr., 62: 285 (Indo-China (Annan)).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), Hainan I., Vietnam.
subsp. *taiwanella* GRESSITT, 1951 巴斯氏矮天牛
GRESSITT, 1951, Longicornia, 2; 499 (Rokki).
Distr.: Taiwan.
- S. ordinata* BATES, 1873
BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 318 (Japan).
Distr.: Taiwan; Japan, Hainan I., SE China.
subsp. *flavostriata* HAYASHI, 1968 黃條麗紋矮天牛
HAYASHI, 1968, Ent. Rev. Japan, 21(1): 16 (Japan (Ryukyu Is.)).
alternatus: MIWA, 1933, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 23(124): 13 (Japan (Ryukyu Is.)).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is. (Yaeyama I.)).
- S. baculina* BATES, 1866 後紋矮天牛
BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 352 (Taiwan).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).
- S. maculiclunis* MATSUSHITA, 1931 鳳山矮天牛
MATSUSHITA, 1931, Mitt. Zool. Mus. Berl., 17: 404 (Hozan, Taihorin, Alikang).
Distr.: Taiwan.
- S. kotoensis* MATSUSHITA, 1934 蘭嶼矮天牛
MATSUSHITA, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 23(135): 541 (Lanyu I.).
Distr.: Taiwan (Lanyu I.).
- S. miscanthivola* MAKIHARA, 1979 盧韋矮天牛
MAKIHARA, 1979, Ent. Rev. Japan, 30(1/2): 25 (Japan (Yonaguni I.)).
Distr.: Taiwan; Japan (Yonaguni I.).
- S. narai* HAYASHI, 1976 南山矮天牛
HAYASHI, 1976, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 11: 14 (Nanshanchi).
Distr.: Taiwan.
- S. punctatostriata* BATES, 1866 棉天牛
BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 351 (Taiwan).
gossipi MATSUMURA, 1912, Spec. Bull. Agr. Exp. Sta. Formosa, 5: 219, pl. 11, f. 1-4.
Distr.: Taiwan; Hainan I., SE China.
- S. bioculata* PIC, 1925 眼紋矮天牛
PIC, 1925, Bull. Soc. Ent. France, p. 302 (China).
Distr.: Taiwan; E China.
subsp. *quadrinotata* SCHWARZER, 1925 角紋矮天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 145 (Kankau).
Distr.: Taiwan.
- S. botelensis* BREUNING et OHBAYASHI, 1966 耶美矮天牛
BREUNING et OHBAYASHI, 1966, Bull. Jap. Ent. Acad., 2(3): 13 (Lanyu I.).
Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

S. albomaculata BREUNING, 1939

BREUNING, 1939, Festschr. E. Strand, 5: 264 (N. China).

Distr.: Taiwan; N China.

subsp. *formosana* BREUNING, 1964 白紋矮天牛

BREUNING, 1964, Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 30: 305.

Distr.: Taiwan.

Genus *Sybrodiboma* BREUNING, 1853 臺灣矮天牛屬*Sybrodiboma* BREUNING, 1853, Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg., 29(8): 16 (Type-species: *Sybra subfasciata* BATES, 1884).*Sybrodiboma taiwanensis* HAYASHI, 1974 臺灣矮天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 51 (Lishan).

Distr.: Taiwan.

Genus *Palausybra* GRESSITT, 1956 欠翅矮天牛屬*Palausybra* GRESSITT, 1956, Insects Micronesia, 17(3): 153 (Type-species: *P. vestigialis* GRESSITT, 1956).*Palausybra chibi* HAYASHI, 1974 特徵天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 41 (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Paraneosybra* HAYASHI, 1978 黃條矮天牛屬*Paraneosybra* HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 107 (Type-species: *P. fulvofasciata* HAYASHI, (1978)).*Paraneosybra fulvofasciata* HAYASHI, 1978 南山黃條矮天牛

HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 108 (Nanshanchi).

Distr.: Taiwan.

Genus *Brachysybra* BREUNING 1940 短圓矮天牛屬*Brachysybra* BREUNING, 1940, Folia Zool. Hydrob., 10: 127 (Type-species: *B. elliptica* BREUNING, 1940).*Brachysybra elliptica* BREUNING, 1940 長圓矮天牛

BREUNING, 1940, Folia Zool. Hydrob., 10: 428 (Philippines).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.); Philippines.

Genus *Neosybra* BREUNING, 1939 姬艷紋矮天牛屬*Neosybra* BREUNING, 1939, Festschr. E. Strand, 5: 276 (Type-species: *N. ropicoides* BREUNING, 1939).*Cornalis*: MATSUSHITA, (nec THOMSON, 1864) 1933, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ., 34(2): 370.*Neosybra costata* (MATSUSHITA, 1933) 隆條矮天牛MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 370 (*Cornalis*) (Toroen).

Distr.: Taiwan.

N. sinuicosta GRESSITT, 1951 波條矮天牛

GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 502, pl. 20, f. 2-4 (Shinhassenzan).

Distr.: Taiwan.

Genus *Rondonia* BREUNING, 1962 雙紋矮天牛屬

Ronconia BREUNING, 1962, Bull. Soc. R. Sci. Nat. Laos, 3: 7 (Type-species: *R. ropioides* BREUNING, 1962).

Rondonia bisignata HAYASHI, 1976 雙紋矮天牛

HAYASHI, 1976, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 11: 16 (Kenting Park).

Distr.: Taiwan.

Tribe Hippopsini 瘦天牛族

Genus *Aulaconotus* THOMSON, 1864 溝翅天牛屬

Aulaconotus THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 99 (Type-species: *A. pachypezoides* THOMSON, 1864).

A. gracilicornis MAKIHARA et SAITO, 1985 纖角溝翅天牛

MAKIHARA et SAITO, 1985, Mis. Rep. Hiwa Mus. Nat. Hist., 23: 14 (Kenting Park).

pachypezoides: TAKASU, 1981 (nec THOMSON), Sayabane, 7: 17 (Wulai) (In Japanese).

Distr.: Taiwan.

Genus *Pothyne* THOMSON, 1864 白條瘦天牛屬

Pothyne THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 97 (Type-species: *P. variegata* THOMSON, 1864).

Neopothyne MATSUSHITA, 1931, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., 12: 46 (Type-species:

N. variegata MATSUSHITA, 1931=*Pothyne variegata* THOMSON, 1864).

Pothyne albolineata MATSUSHITA, 1933 白條瘦天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 383 (Taihorin).

Distr.: Taiwan.

P. formosana SCHWARZER, 1925

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 146 (Kosempo, Kankau et Sokutsu).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

subsp. *formosana* SCHWARZER, 1925, s. str. 臺灣沉香瘦天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 146 (Kosempo, Kankau et Sokutsu).

Distr.: S. Taiwan.

subsp. *nanshanchina* TAKAKUWA et KUSAMA, 1979 南山沉香瘦天牛

TAKAKUWA et KUSAMA, 1979, Elytra, 7(1):10 (Nanshanchi, Lienhwachi, Hui-Sun

Exptl. Forest, Palin, Yangmingshan).

Distr.: Central & North Taiwan.

P. lanhsuensis HAYASHI, 1978 蘭嶼瘦天牛

HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 108 (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

- P. semiaulaconotus* HAYASHI, 1974 顆胸瘦天牛
HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 43 (Taiwan).
Distr.: Taiwan.
- P. variegata* THOMSON, 1864 灰紋瘦天牛
THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 97 (Malaysia).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), Siam, Burma, Assam.
- P. virginalis* TAKAKUWA et KUSAMA, 1979 墾丁瘦天牛
TAKAKUWA et KUWAMA, 1979, Elytra, 7(1): 4 (Kenting Park).
Distr.: Taiwan.
- P. silacea* PASCOE, 1871 琉球白條瘦天牛
PASCOE, 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)8: 278 (Japan).
imasakai HAYASHI, 1976, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 11: 18 (Japan
(Yonaguni I.)).
Distr.: Taiwan; Japan, China, Hainan I.
- P. annulata* BREUNING, 1942 縱條瘦天牛
BREUNING, 1942, Folia Zool. Hydrobiol., 6: 167 (Japan).
silacea MATSUSHITA (nec PASCOE), 1933, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ., 34;
384.
silacea KOJIMA et HAYASHI (nec PASCOE), 1969, Insects' Life in Japan, 1: 106,
pl. 32, f. 4; KUSAMA (nec PASCOE), 1973, List Ecology & Dist. Jap. Ceramb.,
p. 94.
Distr.: Taiwan(?); Japan, Hainan I.

Genus *Hyllisia* PASCOE, 1864 大島瘦天牛屬

- Hyllisia* PASCOE, 1864, J. Ent., 2: 285 (Type-species: *H. stenideoides* PASCOE, 1864).
Falsanandra PIC, 1924, Melang Exot.-Ent., 41: 17 (Type-species: *F. albocincta* PIC,
1924).
Hippopsis GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 536, 541 (nec SERVILLE, 1825).
Hyllisia taihokensis (MATSUSHITA, 1933) 黃條瘦天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 385 (*Pothyne*) (Taihoku).
Distr.: Taiwan.

Genus *Pseudocalamobius* KRAATZ, 1879 細角瘦天牛屬

- Pseudocalamobius* KRAATZ, 1879, Duet. Ent. Zeit., 23: 116 (Type-species: *Calamobius
japonicus* BATES, 1873).
Pseudocalamobius filiformis FAIRMAIRE, 1888
FAIRMAIRE, 1888, Revue d'Ent., 7: 146 (China).
Distr.: Taiwan; China.
subsp. *taiwanensis* MATSUSHITA, 1931 s. str. 臺灣細角瘦天牛
MATSUSHITA, 1931, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17: 404 (*P. taiwanensis*) (Fuhosho).
Distr.: Taiwan.

P. piceus GRESSITT, 1951 黑身瘦天牛

GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 543 (China).

Distr.: Taiwan; China.

P. leptissimus GRESSITT, 1936 阿里山瘦天牛

GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 103, pl. 1, f. 14 (Arisan, Taiheizan).

Distr.: Taiwan; SE. China.

Genus *Metopoplectus* GRESSITT, 1937 紅長角天牛屬*Metopoplectus* GRESSITT, 1937, Philip. J. Sci., 61: 104 (Type-species: *M. taiwanensis* GRESSITT, 1937).*Metopoplectus taiwanensis* GRESSITT, 1936 姬棗紅長角天牛

GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 105, pl. 1, f. 15 (Hori).

Distr.: Taiwan.

Genus *Cleptometopus* THOMSON, 1864 斜帶長角天牛屬*Cleptometopus* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp.95, 389 (Type-species: *C. terrestris* THOMSON, 1864).*Apophrena* PASCOE, 1866, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 323, 324 (Type-species: *A. filifera* PASCOE, 1866).*Smermus* LACORDAIRE, 1869, Hist. Nat. Ins., Gen. Col., 9: 692, 696 (Type-species: *S. mniszehi* LACORDAIRE, 1869).*Acroama* JORDAN, 1894, Novit. Zool., 1: 501 (Type-species: *A. armata* JORDAN, 1894).*Anapophrena* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 43: 28 (Type-species: *A. lutenotata* PIC, 1925).*Mimocleptometopus* PIC, 1934, Mat. Long., 11(2): 36 (Type-species: *M. undulatus* PIC, 1934).*Metopoplectus* GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 104 (Type-species: *M. taiwanensis* GRESSITT, 1936).*Itohigea* MATSUSHITA, 1938, Insecta Mats., 12(2/3): 102 (Xylorhizini) (Type-species: *I. bimaculata* MATSUSHITA, 1938).*Cleptometopus orientalis* MITONO, 1934 棗紅長角天牛

MITONO, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 24: 492 (Hori, Karenko, Kahodai).

Distr.: Taiwan.

Tribe *Pteropliini* 鏽天牛族Genus *Abryna* NEWMAN, 1842 鏽麗天牛屬*Abryna* NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 289 (Type-species: *A. coenosa* NEWMAN, 1842).*Abryna coenosa* NEWMAN, 1842

NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 289 (Philippines).

?subuniformis PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 43: 30.

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), S. China, Philippines.

- subsp. *obscura* SCHWARZER, 1925 銹麗天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 65 (Taihorin).
superba PIC, 1932, Echange, 48: 24 (Taiwan).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Niphona* MULSANT, 1839 灰叉尾天牛屬

- Niphona* MULSANT, 1839, Col. France Long., 1: 369 (Type-species: *N. picticornis* MULSANT, 1839).
Camptocnema THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 54, 367 (Type-species: *N. lateralis* WHITE, 1858).
Ocheutes THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 54, 368 (Type-species: *N. scopulifera* DEJ.).
Aelara THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 55, 368 (Type-species: *N. regis-fernandi* PAIVA, 1860).
Niphona furcata (BATES, 1873) 灰身叉尾天牛
 BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)7: 314 (*Aelara*) (Japan).
 Distr.: Taiwan; Japan, China.
N. parallela (WHITE, 1858) 印度叉尾天牛
 WHITE, 1858, Ann. Mag. Nat. Hist., (3)2: 267 (*Aelara*) (N. India).
minor LAMEERE, 1893, Ann. Soc. Ent. France, 62: 284 (*Aelara*) (Cambodia).
 Distr.: Taiwan; China, Burma, N. India, Cambodia, Hainan.
N. yanoi MATSUSHITA, 1934
 MATSUSHITA, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 24: 240 (Kuraru).
 Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), Hainan I.
 subsp. *yanoi* MATSUSHITA 1934, s. str. 矢野氏叉尾天牛
 MATSUSHITA, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 24: 240 (Kuraru).
 Distr.: Taiwan; Japan.

Genus *Nipholophia* GRESSITT, 1951 擬叉尾天牛屬

- Nipholophia* GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 458 (Type-species: *N. chujoi*, GRESSITT, 1951).
Nipholophia chujoi GRESSITT, 1951 中條氏擬叉尾天牛
 GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 458 (Musha).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Falsoterinaea* MATSUSHITA, 1938 平山天牛屬

- Falsoterinaea* MATSUSHITA, 1938, Kontyû, 12: 95 (n. n. for *Hirayamaia* MATSUSHITA, 1937).
Falsoterinaea fusciorufa (MATSUSHITA, 1937) 棗紅平山天牛
 MATSUSHITA, 1937, Kontyû, 11: 103 (*Hirayamaia*) (Musha).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Pterolophia* NEWMAN, 1842 锈天牛屬

- Pterolophia* NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 370 (Type-species: *Mesosa? bigibbera* NEWMAN, 1842).
- Subgenus *Pterolophia* NEWMAN, 1842, s. str.
- Albana* MULSANT, 1846, Col. Fr. Long. Suppl., p. 13 (Type-species: *A. m-griseum* MULSANT, 1846).
- Prioneta* BLANCHARD, 1853, in d'Urville, Voy. Pole Sud., Zool., 4: 292, pl. 17, f. 11 (Type-species: *P. albosignata* BLANCHARD, 1853).
- Praonetha* PASCOE, 1862, J. Ent., 1: 348 (n. n. pro. *Prioneta* BLANCHARD, 1853).
- Theticus* THOMSON, 1858, Arc. Nat., 2: 190 (Type-species: *T. biarcuatus* THOMSON, 1858).
- Alyattes* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 48 (Type-species: *A. guiennensis* THOMSON, 1864).
- Prionetopsis* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 49 (Type-species: *P. batteata* THOMSON, 1864=*Lamia inaequalis* FABRICIUS, 1801).
- Cormia* PASCOE, 1864, J. Ent., 2: 281 (Type-species: *C. ingrata* PASCOE, 1864).
- Anaches* PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, 3(3): 160 (Type-species: *Sthenias dorsalis* PASCOE, 1858).
- Eurycotyle* BLESSIG, 1873, Trudy Russk. Ent. Obschch., 9: 210 (Type-species: *E. maaeki* BLESSIG, 1873).
- Acroptycha* QUEDENFELDT, 1888, Berl. Ent. Z., 32: 209 (Type-species: *A. spinifera* QUEDENFELDT, 1888).
- Incamelomorpha* PIC, 1926, Melang. Exot-Ent., 46: 4 (Type-species: *Pterolophia (Incamelomorpha) depensis* PIC, 1926) (subg.).
- Paralophira* AURIVILLIUS, 1924, Zool. Meded., 8: 30 (Type-species: *P. quadrinodosa* AURIVILLIUS, 1924).
- Pterolophia* (*P.*) *angusta* (BATES, 1873) 圓紋锈天牛
BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 317 (*Praonetha*) (Japan).
Distr.: Taiwan(?); Japan, NE. China.
- P.* (*P.*) *bigibbera* (NEWMAN, 1842) 雙瘤锈天牛
NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 323 (*Mesosa?*) (Philippines).
camura NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 371 (Philippines).
binodosa BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 350 (*Praonetha*) (Taiwan).
saipana OHBAYASHI, 1941, Tenthredo, 3(3): 225 (Saipan Is.).
Distr.: Taiwan; Japan (Ogasawara Is.), Philippines, Mariana.
- P.* (*P.*) *kaleea* (BATES, 1866)
BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 351 (*Praonetha*) (Taiwan).
subleiopodina BREUNING et OHBAYASHI, 1964, Bull. Japan Ent. Acad., 1(4): 16 (Japan (Ryukyu Is.)).
subexternefasciata MITONO, 1941, Cat. Col. Japan., (8): 172 (nec PIC, 1926).
matsushitai KUSAMA, 1965, New Ins. Collect., (Ge), p. 470 (Japan (Ryukyu Is.)) (nec BREUNING, 1937).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), China.

- subsp. *kaleea* (BATES, 1866) s. str. 姬後紋銹天牛
 BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 351 (*Praonetha*) (Taiwan).
 Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).
- subsp. *inflexa* GRESSITT, 1940 華南姬後紋銹天牛
 GRESSITT, 1940, Lingnan Soc. J., 19: 11, pl. 1, f. 3 (China).
 Distr.: Taiwan; S. China.
- P. (P.) matsushitai* BREUNING, 1938 松下氏銹天牛
 BREUNING, 1938, Festchr. E. Strand, 4: 289 (Kuraru).
 Distr.: Taiwan.
- P. (P.) obscura* SCHWARZER, 1925
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 66 (Taiwan).
 Dirst.: Taiwan.
- subsp. *obscura* SCHWARZER, 1925 藤花銹天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 66 (Taiwan).
 Distr.: Taiwan.
- subsp. *postmaculatoides* BREUNING, 1968 曇紋銹天牛
 BREUNING, 1968, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, p. 57 (n. n.)
obscura postmaculata BREUNING et OHBAYASHI, 1966, Bull. Jap. Ent. Acad., 2(3): 13.
 Distr.: Taiwan.
- P. (P.) reduplicata* GRESSITT, 1951 八仙銹天牛
 GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 471, pl. 18, f. 9 (Hassenzan)
 Distr.: Taiwan.
- P. (P.) zonata* (BATES, 1873) 白尾銹天牛
 BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 315 (*Praonetha*) (Japan).
 Distr.: Taiwan(?); Japan.
- P. (P.) laterialba* (SCHWARZER, 1925) 白緣銹天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 68 (*Albana*) (Anping).
 Distr.: Taiwan.
- P. (P.) variantennalis* BREUNING, 1970 大埔林銹天牛
 BREUNING, 1970, Koleop. Rdsch., 48: 10 (Taihorinsho).
 Distr.: Taiwan.
- Subgenus *Hylobrotus* LACORDAIRE, 1869
- Hylobrotus* LACORDAIRE, 1869, Hist. Nat. Ins., Gen. Col., 9: 522, 538 (Type-species:
H. ploemi LACORDAIRE, 1872).
- P. (H.) annulata* (CHEVROLAT, 1845) 輪紋銹天牛
 CHEVROLAT, 1845, Rev. Zool., 8: 99 (*Coptops*) (Macao).
bowringii PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 170 (*Praonetha*) (Hong
 Kong).
scutellata SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 66 (Kosempo, Alikang, Kankau).
annulicornis PIC, 1925, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 138 (China).
lacosa PIC, 1926, Melang. Exot.-Ent., 46: 3 (Tonkin).
lunigera AURIVILLIUS subsp. *formosana* HAYASHI, 1960, Ent. Rev. Japan, 11(1):

28 (Japan (Kita-Ogari-jima Is.)); SAMUELSON, 1965, Pacific Insects, 7(1): 108 (part: C. Ryukyu). (nec SCHWARZER, 1925).

Distr.: Taiwan; Japan, S. China, Hong Kong, Macao, Hainan I., Korea, Burma.

P. (H.) latefascia SCHWARZER, 1925 橫帶銹天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 65 (Kosempo et Kankau).

fainanensis PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 45: 32 (Fainan).

yayeyamai BREUNING, 1961, Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg., 37(20): 9 (Japan (Ryukyu Is.)).

horii BREUNING et OHBAYASHI, 1967, Bull. Japan Ent. Acad., 3(2): 3 (Japan (Ryukyu Is.)).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

P. (H.) formosana SCHWARZER, 1925 虹紋銹天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Bl. Biol. Syst. Kafer, 21(2): 66 (*P. lunigera* var.) (Kosempo).

lateralis formosana KUSAMA, 1973, List Ecol. Dist. Japan. Ceramb., p. 99.

Distr.: Taiwan; Japan (Okinawa I.).

Subgenus *Ale* PASCOE, 1865

Ale PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 96, 131 (Type-species: *A. agraria* PASCOE, 1865).

Achriotypa PASCOE, 1875, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)15: 71 (Type-species: *A. basalis* PASCOE, 1875).

P. (Ale) gibbosipennis PIC, 1926

PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 45: 32 (Taiwan).

crispipennis MATSUSHITA, 1931, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17: 403 (Hori).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

subsp. *gibbosipennis* PIC, 1926, s. str. 瘤翅銹天牛

PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 45: 32 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Ovalopraonetha* BREUNING, 1961

Ovalopraonetha BREUNING, 1961, Cat. Lam. Monde, 4: 259 (Type-species: *Pterolophia* (*O.*) *ovalis* BREUNING, 1938) (subg.).

P. (Ovalopraonetha) kanoi HAYASHI, 1966 鹿野氏銹天牛

HAYASHI, 1966, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 1: 7 (Rodofu).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Pseudale*, SCHWARZER, 1925

Pseudale SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 67 (Type-species: *P. fasciata* SCHWARZER, 1925).

P. (Pseudale) dorsotuberculare (HAYASHI, 1984) 裸背銹天牛

HAYASHI, 1984, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 17/18: 33, pl. 2, f. 8 (*Pseudale*?) (Sungkang).

P. (P.) fasciata SCHWARZER, 1925 昇條銹天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 67 (*Pseudale*) (Fuhosho).

camura OHBAYASHI (nec NEWMAN), 1963, Icon. Ins. Japon. Col., 2: 309, pl. 155, f. 10.

Distr.: Taiwan.

- P. (P.) suginoi* MAKIHARA, 1986 杉野氏锈天牛
 MAKIHARA, 1986, Mis. Rep. Hiwa Mus. Nat. Hist., 24: 9 (Hungyeh Wenchuan).
 Distr.: Taiwan.

Subgenus *Lychrosis* PASCOE, 1866

Lychrosis PASCOE, 1866, J. Linn. Soc. London, 9: 89 (Type-species: *Hathlia zebrinus* PASCOE, 1857).

- P. (Lychrosis) zebrinus* (PASCOE, 1857) 白斑锈天牛
 PASCOE, 1857, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 252 (*Hathlia*) (N. India).
 Distr.: Taiwan; N. India, Tonkin, Hainan.

Genus *Marmylaris* PASCOE, 1866 巴克氏锈天牛属

Marmylaris PASCOE, 1866, J. Linn. Soc. London, 9: 88 (Type-species: *Hathlia buckleyi* PASCOE, 1857).

- Marmylaris buckleyi* (PASCOE, 1857) 巴克氏锈天牛
 PASCOE, 1857, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 107 (*Hathlia*) (N. India).
 Distr.: Taiwan(?); N. India, Himalaya.

Genus *Desisa* PASCOE, 1865 霜斑锈天牛属

Desisa PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 163 (Type-species: *Praonetha subfasciata* PASCOE, 1862).

Mesopenthea SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 67 (Type-species: *M. variabilis* SCHWARZER, 1925).

- Desisa kuraruana* (MATSUSHITA, 1935) 霜斑锈天牛
 MATSUSHITA, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 312 (*Mesosella*) (Kuraru).
 Distr.: Taiwan.

- D. takasagona* MATSUSHITA, 1933 蓬菜白条锈天牛
 MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 364, pl. 5, f. 9 (Horisha).
 Distr.: Taiwan.

- D. variabilis* (SCHWARZER, 1925) 斑纹锈天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 67 (*Mesopenthea*) (Sokutsu).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Egesina* PASCOE, 1864 新岛氏矮天牛属

Egesina PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 29, 49 (Type-species: *E. rigida* PASCOE, 1864).

Cuphisia PASCOE, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 229 (Type-species: *C. callosa* PASCOE, 1866).

Callienispia FISHER, 1925, Philip. J. Sci., 28: 210 (Type-species: *C. elegans* FISHER, 1925).

Platyzeargyra FISHER, 1925, Philip. J. Sci., 28: 213 (Type-species: *P. bakeri* FISHER, 1925).

Neoegesina FISHER, 1925, Philip. J. Sci., 28: 215 (Type-species: *N. ornata* FISHER, 1925).

Subgenus *Egesina* PASCOE, 1864

Egesina PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 29, 49 (Type-species: *E. rigida* PASCOE, 1864).

Egesina (Egesina) albofasciata HAYASHI, 1974 白點矮天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 46 (Lushan or Hotso).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Nijimaia* MATSUSHITA, 1933

Nijimaia MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., 34(2): 386 (Type-species: *Nijimaia bifasciana* MATSUSHITA, 1933).

Egesina subgen. *Pseudenispia* BREUNING, 1938, Festschr. 60 Geburtst. E. Strand., 4: 388 (Type-species: *Pseudenispia albomarmorata* BREUNING, 1938).

Egesina (Nijimaia) fascolaterimaculata HAYASHI, 1971 側紋新島天牛

HAYASHI, 1971, Ent. Rev. Japan, 23(1): 13 (Tienhsiang).

Distr.: Taiwan.

E. (N.) formosana (SCHWARZER, 1925) 蓬萊新島天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 68 (*Enispia*) (Kosempo).

Distr.: Taiwan.

Genus *Sthenias* CASTELNAU, 1840 長角鏽天牛屬

Sthenias CASTELNAU, 1840, Hist. Nat. Col., 2: 466 (Type-species: *Lamia grisator* FABRICIUS, 1987).

Chalarus FAHRAEUS, 1872, Ofvers. Vet. Akad. Forh., 29, 2: 45 (Type-species: *C. leucaspis* FAHRAEUS, 1872=*cylindrator* FABRICIUS, 1801).

Anomamomus FAHRAEUS, 1872, Col. Hefte, 10: 194 (n. n. for *Chalarus*).

Thysanodes NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 292.

Albosthenias BREUNING, 1961, Bull. Mus. Hist. Nat. Ser. 2, 32: 538 (Type-species: *A. albicollis* GAHAN, 1890).

Sthenias cylindricus GRESSITT, 1939 白紋長角鏽天牛

GRESSITT, 1939, Notes d'Ent. Chinoise, 6: 114, pl. 3, f. 7 (China).

Distr.: Taiwan; E. China.

S. semicylindricus HAYASHI, 1974 大白紋長角鏽天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 45 (Juisui).

Distr.: Taiwan.

Genus *Similosodus* MCKEOWN, 1945 裸胸天牛屬

Similosodus MCKEOWN, 1945, Rec. Austral. Mus., 21: 292 (n. n. for *Sodus* PASCOE, 1864).

Sodus PASCOE: (nec AMYOT), 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 137 (Type-species: *S. verticalis* PASCOE, 1864).

Similosodus taiwanus HAYASHI, 1966 黃條裸胸天牛

HAYASHI, 1966, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 1: 8 (Paran).

Distr.: Taiwan.

Tribe Morimopsini 赤銅天牛族Genus *Dolophrades* BATES, 1884 泥色粗角天牛屬*Dolophrades* BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 237 (Type-species: *D. terrenus* BATES, 1884).*Corcadiohammus* PIC, 1934, Mel. Exot.-Ent., 63: 8 (Type-species: *D. punctatus* PIC, 1934).*Dolophrades punctatus* (PIC, 1934) 偽疤粗角天牛
PIC, 1934, Melang Exot.-Ent., 63: 8 (Taiwan).
Distr.: Taiwan.**Tribe Phrissomini** 長角瘤叉尾天牛族Genus *Mesechthistatus* BREUNING, 1950 瘤叉尾天牛屬*Mesechthistatus* BREUNING, 1950, Longicornia, 1: 222 (Type-species: *Echthistatus binodosus* WATERHOUSE, 1881).*Mesechthistatus yamahoi* (MITONO, 1943) 山保氏瘤叉尾天牛
MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33: 578, f. 1 (*Echthistatus*) (Taito: Aroe).
Distr.: Taiwan.**Tribe Agnini** 長角天牛族Genus *Aethalodes* GAHAN, 1888 瘤條天牛屬*Aethalodes* GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)1: 270 (Type-species: *A. verrucosus* GAHAN, 1888)*Aethalodes verrucosus* GAHAN, 1888

GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)1: 270, pl. 16, f. 1 (N. China).

armata NONFRIED, 1892, Ent. Nachr., 18: 93 (*Trachystola*) (China).*nodicollis* FAIRMAIRE, 1900, Ann. Soc. Ent. France, 68: 640 (China).

Distr.: Taiwan; China, Tonkin.

subsp. *formosanus* KRIESCHE, 1924 蓬萊瘤條天牛KRIESCHE, 1924, Deut. Ent. Zeit., p. 285 (*A. formosanus*) (Kosempo et Taihorin).

Distr.: Taiwan.

Genus *Aristobia* THOMSON, 1868 細角長天牛屬*Aristobia* THOMSON, 1868, Physis, 2: 178 (Type-species: *Cerosterna hispida* SAUNDERS, 1863).*Aristobia hispida* (SAUNDERS, 1863) 細角長天牛

SAUNDERS, 1863, Trans. Ent. Soc. London, (2)2: 112, pl. 4. f. 6 (N. China).

Distr.: Taiwan; China, Hainan I., Tonkin.

Genus *Psacotha* GAHAN, 1888 黃星天牛屬

Psacotha GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 400 (Type-species: *Monohammus hilaris* PASCOE, 1857).

Psacotha hilaris (PASCOE, 1857)

PASCOE, 1857, Trans. Ent. Soc. Lond., (2)4: 193 (*Monohammus*) (N. China).

Distr.: Taiwan; Japan, Korea, China.

subsp. *hilaris* (PASCOE, 1857) s. str. 黃星長角天牛

PASCOE, 1857, Trans. Ent. Soc. Lond., (2)4: 193 (*Monohammus*) (N. China).

Distr.: Taiwan; Japan, Korea, China.

subsp. *botelensis* BREUNING et OHBAYASHI, 1966 蘭嶼黃星天牛

BREUNING et OHBAYASHI, 1966, Bull. Japan Ent. Acad., 2(6): 12

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Epepeotes* PASCOE, 1866 縱紋長角天牛屬

Epepeotes PASCOE, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 249 (Type-species: *Lamia lusca* FABRICIUS, 1866).

Epepeotes ambigenus CHEVROLAT, 1841

CHEVROLAT, 1841, Rev. Zool., 4: 228

ambiguus DILLON et DILLON, 1941, Read. Publ. Mus., Soc. Publ., 1: 43, pl. 3, f. 23.

Distr.: Taiwan; Philippines.

subsp. *formosanus* BREUNING, 1943 蘭嶼縱紋長角天牛

BREUNING, 1943, Novit. Ent., 13, suppl. 3: 228 (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I., Lutau I.).

Genus *Paraleprodera* BREUNING, 1935 棗紅長角天牛屬

Paraleprodera BREUNING, 1934, Fol. Zool. hydrobiol., 8: 253 (Type-species: *Lamia crucifera* FABRICIUS, 1792).

Paraleprodera diophthalma (PASCOE, 1856)

PASCOE, 1856, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 49 (*Morimus*) (N. China).

bioculata FAIRMAIRE, 1900, Ann. Soc. Ent. France, 68: 641 (*Leprodera*) (China).

Distr.: Taiwan; E. et W. China.

subsp. *formosana* (SCHWARZER, 1925) 雙爪長角天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 58 (*Leprodera bioculata* subsp.) (Kosempo).

Distr.: Taiwan.

P. itzingeri BREUNING, 1935 四星棗紅長角天牛

BREUNING, 1935, Fol. Zool. Hydrobiol., 8: 254 (Taiwan).

carolina: SCHWARZER (nec FAIRMAIRE), 1925, Ent. Blaett., 21: 58 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

Genus *Callophora* THOMSON, 1864 麗紋星天牛屬

Callophora THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 76 (Type-species: *Oplophora sollii* HOPE, 1840).

Oplophora HOPE (nec MILNE-EDWARDS), 1839, Proc. Linn. Soc. London, 1: 43 (Type-species: *Oplophora sollii* HOPE, 1840).

Callophora albopicta (MATSUSHITA, 1933) 麗艷大星斑天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 333, pl. 4, f. 2 (*Cyriocrates* Taiwan).

elegans KANO, 1933, Kontyû, 6: 279 (*Melanauster*) (Hori).

Distr.: Taiwan.

Genus *Anoplophora* HOPE, 1839 星天牛屬

Anoplophora HOPE, 1839, Proc. Linn. Soc. London, 1: 43 (Type-species: *A. stanleyana* HOPE, 1839).

Melanauster THOMSON, 1868, Physis, 2: 181 (Type-species: *Cerambyx chinensis* FORSTER, 1771).

Micromelanauster PIC, 1931, Ent. Nachr. Bl., 5: 49 (Type-species: *Monohammus bowringi* WHITE, 1858).

Subgenus *Anoplophora* HOPE, 1839, s. str.

Anoplophora (*A.*) *beryllina* HOPE, 1840

HOPE, 1840, Proc. Linn. Soc. London, 1: 79 (*Monochamus*) (Assam).

melanostictus WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, 24: 407 (*Monochamus*) (N. India).

argentifer PIC, 1902, Mat. Long., 4, 1: 31 (*Melanauster*) (China).

Distr.: Taiwan(?); Assam, N. India, Burma, Tonkin, China.

subsp. *bowringii* (WHITE, 1858) 保玲氏四條天牛

WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, 26: 398, pl. 53, f. 1 (*Monochammus bowringii*) (Hong Kong).

Distr.: Taiwan(?); S. China.

A. (*A.*) *wusheana* CHANG, 1960 霧社星天牛

CHANG, 1960, Bull. Soc. Plant Pathology and Entomology, 11(3/4): 2, pl. 1, f. 2 (Wu-she).

Distr.: Taiwan.

A. flavomaculata (GRESSITT, 1934) 黃星天牛

GRESSITT, 1934, Philip. J. Sci., 55: 385 (*Melanauster*) (Karapin).

Distr.: Taiwan.

A. lurida (PASCOE, 1856) 黑星天牛

PASCOE, 1856, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 47 (*Monohammus*) (N. China).

Distr.: Taiwan; China.

A. macularia (THOMSON, 1865) 星天牛

THOMSON, 1865, Syst. Ceramb., p. 553 (*Callophora*) (N. China).

Distr.: Taiwan; China.

A. nobilis (GANGLBAUER, 1889) 黃背星天牛

GANGLBAUER, 1889, Hor. Soc. Ent. Ross., 24: 82 (*Malanauster*) (China).

luteonotatus PIC, 1925, Mel. Exot.-Ent., 43: 21 (*Melanauster*) (China).

Distr.: Taiwan; China.

- A. davidis* (FAIRMAIRE, 1886) 大衛星天牛
 FAIRMAIRE, 1886, Ann. Soc. Ent. France, (6)6: 355 (*Melanauster*) (China).
zonator GAHAN (nec THOMSON), 1894, Ann. Mus. Civ. Genova, 34: 39 (*Melanauster*)
 (Burma).
 Distr.: Taiwan; China, Burma, Laos, Cambodia, Thailand.
- A. versteegi* (RITSEMA, 1881) 灰翅星天牛
 RITSEMA, 1881, Notes Leyden Mus., 3: 155 (*Monohammus*) (Sumatra).
albescens PIC, 1920, Melang Exot.-Ent. 32: 2 (*Monochamus*) (Tonkin).
 Distr.: Taiwan(?); Sumatra, Burma, Assam, NE. India, Tonkin, Laos, Hainan I.,
 China, Vietnam.

Subgenus *Cyriocrates* THOMSON, 1868

- Cyriocrates* THOMSON, 1868, Physis, 2: 181 (Type-species: *Oplophora horsfieldii* HOPE, 1842).
- A. (Cyriocrates) horsfieldi* HOPE, 1842
 HOPE, 1942, Proc. Ent. Soc. London, LXI (*Oplophora*) (Assam).
voluptuosa THOMSON, 1856, Rev. Mag. Zool., (2)8: 529 (*Cerosterna*).
 Distr.: Taiwan; Tonkin, Assam, China.
- subsp. *tonkinensis* (KRIESCHE, 1925). 荷菲氏星天牛
 KRIESCHE, 1925, Deut. Ent. Zeit., p. 287 (*Cyriocrates*) (Tonkin).
 Distr.: Taiwan; Tonkin.

Genus *Eupromus* PASCOE, 1858 紅星天牛屬

- Eupromus* PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, Proc., p. 12 (Type-species: *Lamia rubra* DALMAN, 1817).
- Eupromus ruber* (DALMAN, 1817) 紅星天牛
 DALMAN, 1817, in Schonh., Syn. Ins. 1, 3, app., p. 167 (*Lamia*) (E. Indies).
sieboldi GUERIN, 1844 (Icon. Regne Anim. Ins., p. 238 (*Oplophora (Callimation)*)
 (Japan).
championi WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, 26: 398 (*Monohammus*) (China).
 Distr.: Taiwan; Japan, China.

Genus *Eutaenia* THOMSON, 1857 却巴氏粗天牛屬

- Eutaenia* THOMSON, 1857, Arch. Ent., 1: 184 (Type-species: *Ceroplesis javeti* THOMSON, 1857).
- Eutaeniopsis* GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)1: 277 (Type-species: *Lamia trifasciella* WHITE, 1850).
- Eutaenia formosana* MATSUSHITA, 1941 高士佛粗天牛
 MATSUSHITA, 1941, Ins. Mats., 15: 156 (Kuskus).
 Distr.: Taiwan.
- E. trifasciella* (WHITE, 1850) 三條粗天牛
 WHITE, 1850, Proc. Zool. Soc. London, p. 13, pl. 13, f. 1 (*Lamia (Celosterna)*)
 (Hong Kong).
javeti THOMSON, 1857, Arch. Ent., 1: 125 (*Ceroplesis*) (Penang).

trifasciata THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 72.

Distr.: Taiwan; N. India, Penang, Tonkin, S. China, Hong Kong.

Genus *Cereopsius* PASCOE, 1862 白條絨毛天牛屬

Cereopsius PASCOE, 1862, J. Ent., 1: 344 (Type-species: *C. exoletus* PASCOE, 1862).

Etymestia PASCOE, 1866, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 236 (Type-species: *Cereopsius helena* WHITE, 1858).

C. shamankarriyali KANO, 1939 呂宋粗天牛

KANO, 1939, Annot. Zool. Jap., 18: 30, pl. 2, f. 3 (Luzon).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.); Philippines.

Genus *Blepephaeus* PASCOE, 1866 曇紋粗天牛屬

Blepephaeus PASCOE, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 249 (Type-species: *Monohammus succinator* CHEVROLAT, 1852).

B. succinator (CHEVROLAT, 1852) 曇紋粗天牛

CHEVROLAT, 1852, Rev. Mag. Zool., (2)4: 417 (*Monohammus*) (China).

sublineatus WHITE, 1958, Proc. Zool. Soc. London, 26: 410 (*Monohammus*) (India).

obfuscatus WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, 26: 411 (*Monohammus*) (Hong Kong).

fleutiauxi LAMEERE, 1893, Ann. Soc. Ent. France, 62: 283 (*Coelosterna*) (Cochin-China).

humeralis PIC, 1925, Mel. Exot.-Ent., 43: 18 (China).

Distr.: Taiwan; China, Hainan, Tonkin-China, Assam, Tenasserim, India, Siam, Malacca.

Genus *Peblephaeus* KUSAMA et TAKAKUWA, 1984 麗紋粗天牛屬

Peblephaeus KUSAMA et TAKAKUWA, 1984, Longicorn-Beetles of Japan, p. 449 (Type-species: *Cereopsius decoloratus* SCHWARZER, 1925).

Peblephaeus decoloratus (SCHWARZER, 1925)

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 39 (*Cereopsius*) (Sokutsu et Kosempo).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

subsp. *decoloratus* (SCHWARZER, 1925) s. str. 麗紋粗天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 59 (*Cereopsius*) (Sokutsu et Kosempo).

Distr.: Taiwan.

P. ziczac (MATSUSHITA, 1940) 曲紋粗天牛

MATSUSHITA, 1940, Ins. Mats., 14: 54 (*Etymestia*) (Musha).

Distr.: Taiwan.

Genus *Parapolytretus* BREUNING, 1944 皺紋粗天牛屬

Parapolytretus BREUNING, 1944, Novit. Ent., 14, suppl., 3: 370 (Type-species: *Cycos rugosus* MATSUSHITA, 1933).

Parapolytretus rugosus (MATSUSHITA, 1933) 皺紋粗天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 335, pl. 4, f. 10 (*Cycos*) (Otsubo).

Distr.: Taiwan.

Genus *Nanohammus* BATES, 1884 褐白星天牛屬

Nanohammus BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 243 (Type-species: *N. rufescens* BATES, 1884).

Microcycos PIC, 1934, Melang. Exot.-Ent., 63: 9 (Type-species: *Microcycos annulicornis* PIC, 1934).

Pararhodopis BREUNING, 1935, Fol. Zool. Hydrobiol., 7: 174 (Type-species: *Rhodopis aberran* GAHAN, 1894).

Rarasanus MATSUSHITA, 1941, Ins. Mats., 15(4): 156 (Type-species: *Rarasanus subfasciatus* MATSUSHITA, 1941).

Nanohammus subfasciatus (MATSUSHITA, 1941) 拉拉山白星天牛

MATSUSHITA, 1941, Insecta Mats., 15(4): 157, f. 3 (*Rarasanus*) (*Rarasan*).

taiyal GRESSITT, 1951, Longicornia, 2, p. 628 (Sankakuho).

oshimanus BREUNING et OHBAYASHI, 1964, Bull. Japan Ent. Acad., 1(4): 15 (Japan (Amami-Oshima)).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

Genus *Paruraecha* BREUNING, 1935 四川長角天牛屬

Paruraecha BREUNING, 1935, Fol. Zool. Hydrobiol., 8: 64 (Type-species: *P. szetschuanica* BREUNING, 1935).

Subgenus *Arisania* GRESSITT, 1936

Arisania GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 106 (Type-species: *A. submarmorata* GRESSITT, 1936).

Paruraecha (Arisania) submarmorata (GRESSITT, 1936) 阿里山長角天牛

GRESSITT, 1936, Philip. J. Sci., 61: 107, pl. 1, f. 16 (*Arisania*) (*Arisan*).

Distr.: Taiwan.

Genus *Uraecha* THOMSON, 1964 叉尾天牛屬

Uraecha THOMSON, 1964, Syst. Ceramb., pp. 84, 383 (Type-species: *Uraecha bimaculata* THOMSON, 1864).

Uraecha angusta (PASCOE, 1856) 西藏細角長天牛

PASCOE, 1856, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 49 (*Monohammus*?) (N. China).

attenuata PIC, 1925, Melang. Exot.-Ent., 43: 23 (Tibet).

Distr.: Taiwan; China.

Genus *Xenohammus* SCHWARZER, 1931 雙紋細角長天牛屬

Xenohammus SCHWARZER, 1931, Senckenbergiana, 13: 204 (Type-species: *X. bimaculatus* SCHWARZER, 1931).

- Xenohammus bimaculatus* SCHWARZER, 1931 埔里雙紋細角長天牛
 SCHWARZER, 1931, Senckenbergiana, 13: 204, f. 22.
filicornis GRESSITT, 1934, Philip. J. Sci., 55: 283 (*Monochammus*) (Hori).
 Distr.: Taiwan; S. China, Hainan I. (?).
- X. nebulosus* SCHWARZER, 1931 雲紋細角長天牛
 SCHWARZER, 1931, Senckenbergiana, 13: 205, f. 15 (Kosempo).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Monochamus* GUERIN-MENEVILLE, 1826 長角天牛屬

- Monochamus* GUERIN-MENEVILLE, 1826, Dict. Class. d'Hist. Nat., 11: 91 (Type-species:
Lamia sutor FABRICIUS, 1775=*Cerambyx sutor* LINNE, 1758).
Meges PASCOE, 1866, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 272 note (Type-species: *Monochammus gravidus* PASCOE, 1858).
- Monochamus kasabi* HEYROVSKY, 1955 卡薩氏長角天牛
 HEYROVSKY, 1955, Ann. Mus. Nat. Hung., 6: 260 (Taiwan).
 Distr.: Taiwan.
- M. alternatus* HOPE, 1842 松斑天牛
 HOPE, 1842, Trans. Ent. Soc. London, Proc., p. 111 (China)
tesserula WHITE, 1858, Proc. Zool. Soc. London, p. 408 (Hong Kong).
 Distr.: Taiwan; Japan, China.
- M. bimaculatus* GAHAN, 1888 雙紋長角天牛
 GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 260 (India).
 Distr.: Taiwan(?); India, Burma, Siam, Malacca, Laos, Tonkin, S. China.
- M. fascioguttatus* GRESSITT, 1938 八仙長角天牛
 GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 156 (Hassenzan).
sintikensis MATSUSHITA, 1939, Ins. Mats., 13: 58 (Shinchiku).
 Distr.: Taiwan; S. China.
- M. taiheizanensis* MITONO, 1943 太平山長角天牛
 MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33: 580 (Taiheizan).
 Distr.: Taiwan.
- M. convexicollis* GRESSITT, 1942 狹胸長角天牛
 GRESSITT, 1942, Notes d'Ent. Chinoises, 9: 83, pl. 1, f. 3 (Tiennu Shan).
 Distr.: Taiwan; E. China.

Genus *Acalolepta* PASCOE, 1858 絨毛天牛屬

- Acalolepta* PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 247 (Type-species: *A. pusio* PASCOE, 1858, monobasic).
- Cypriola* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 16 (Type-species: *C. acanthocinoides* THOMSON, 1864).
- Dihammus* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 80, 381 (Type-species: *Monochamus longicornis* THOMSON, 1857).
- Haplohammus* BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 239 (Type-species: *Monohammus luxuriosus* BATES, 1873).

- Neanthes* PASCOE, 1878, Ann. Mag. Nat. Hist., (5)2: 372 (Type-species: *Monohammus curialis* PASCOE, 1858).
- Astynoscelis* PIC, 1905, Mat. Long., 5, 1: 8 (Type-species: *A. longicornis* PIC, 1905).
- Niphohammus* MATSUSHITA, 1932, Ins. Mats., 6(4): 170 Type-species: *N. korolensis* MATSUSHITA, 1932).
- Saitoa* MATSUSHITA, 1937, Kontyû, 11: 104 (Type-species: *S. teneburosa* MATSUSHITA, 1937).
- Acalolepta degener* (BATES, 1873) 齊藤氏灰小天牛
BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 310 (*Monohammus*) (Japan).
- contemptus* GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 62 (*Haplohammus*) (China).
- nanus* GANGLBAUER, 1889, Trudy Russk. Ent. Obshch., 24: 81 (*Haplohammus*) (China).
- longicornis* PIC, 1905, Mat. Long., 5(1): 8 (*Astynoscelis*) (China).
- savioi* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 45: 21: (*Orsidis*) (China).
- teneburosa* MATSUSHITA, 1937, Kontyû, 11(1/2): 104 (*Saitoa*) (Korea).
- Distr.: Taiwan; China, Korea, Japan.
- A. flocculata* (GRESSITT, 1935)
GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 188 (*Monochamus*) (Hinokiyama).
- Dist.: Taiwan; W. China.
- subsp. *flocculata* (GRESSITT, 1935), s. str. 金星絨毛天牛
GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 188 (*Monochamus*) (Hinokiyama).
- Distr.: Taiwan.
- A. formosana* (BREUNING, 1935) 蓬萊絨毛天牛
BREUNING, 1935, Fol. Zool. Hydrobiol., 7: 251 (*Dihammus*) (Kosempo).
- Distr.: Taiwan.
- A. grossescapa* (BREUNING, 1942) 恆春絨毛天牛
BREUNING, 1942, Fol. Zool. Hydrobiol., 11: 117 (*Dihammus*) (Koshun).
- Distr.: Taiwan.
- A. permutans* (PASCOE, 1857)
PASCOE, 1857, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 103 (*Monohammus*) (N. China).
- Distr.: Taiwan; China, Tonkin.
- subsp. *paucipunctata* GRESSITT, 1938 長角絨毛天牛
GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 157 (*Dihammus*) (Giran et Suisha).
- Distr.: Taiwan.
- A. rusticatrix* (FABRICIUS, 1801)
FABRICIUS, 1801, Syst. El., 2: 294 (*Lamia*) (Sumatra).
- Distr.: Taiwan; Sumatra, E. Indies, India, Tonkin, Philippines.
- subsp. *rusticatrix* (FABRICIUS, 1801), s. str. 鏽絨毛天牛
FABRICIUS, 1801, Syst. El., 2: 294 (*Lamia*) (Sumatra).
- Distr.: Taiwan; Sumatra, E. Indies, India, Tonkin, Philippines.
- subsp. *formosensis* BREUNING et OHBAYASHI, 1966 臺灣鏽絨毛天牛
BREUNING et OHBAYASHI, 1966, Bull. Jap. Ent. Acad., 2(3): 13.
- Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

A. sublusca (THOMSON, 1857)

THOMSON, 1857, Arch. Ent., 1: 293 (*Monochamus*) (Singapore).

curialis PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 246 (*Haplohammus*) (N. China).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), China, Hainan I., Indo-China, Singapore.
subsp. *maculihumera* (MATSUSHITA, 1933) 肩紋絨毛天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ., 34(2): 328 (*Dihammus*) (Horisha).

Distr.: Taiwan.

A. ikedai MITONO, 1943 池田氏絨毛天牛

MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33: 581 (*Dihammus*) (Sozan).

vitalisi GRESSITT (nec PIC), 1951, Longicornia, 2: 404 (*Dihammus*).

Distr.: Taiwan.

A. yokoyamai HAYASHI, 1971 橫山氏絨毛天牛

HAYASHI, 1971, Ent. Rev. Japan, 23(1): 15 (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Mimorsidis* BREUNING, 1938 紅翅天牛屬

Mimorsidis BREUNING, 1938, Novit. Ent., 8: 33 (Type-species: *M. lemoulti* BREUNING, 1938).

Mimorsidis taiwanensis HAYASHI, 1974 臺灣深條天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 47 (Kenting Park).

Distr.: Taiwan.

Tribe *Batocerini* 白條天牛族Genus *Batocera* CASTELNAU, 1840 白條天牛屬

Batocera CASTELNAU, 1840, Hist. Nat. Col., 2: 470 (Type-species: *Cerambyx rubus* LINNÉ, 1758).

Batocera davidis DEYROLLE, 1878 大衛大天牛

DEYROLLE, 1878, Ann. Soc. Ent. France, (5)8: 131 (E. China).

Dist.: Taiwan; S. China, Tonkin.

B. lineolata CHEVROLAT, 1852 白條天牛

CHEVROLAT, 1852, Revue Mag. Zool., (2)4: 417 (China).

chinensis THOMSON, 1857, Arc. Nat., 1: 170 (N. China).

catenata VOLLENHOVEN, 1871, Tijdschr. Ent., p. 215.

flachi SCHWARZER, 1914, Ent. Mitt., 3: 280 (China).

hauseri SCHWARZER, 1914, Ent. Mitt., 3: 280 (China).

Distr.: Taiwan; Japan, China, Korea, Quelpart I.

B. punctata SCHWARZER, 1925 臺灣大天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 60 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

B. rubus (LINNÉ, 1758)

LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10: 390 (*Cerambyx*) (India).

stigma VOET, 1778, Cat. Col., 2: 15, pl. 13, f. 54 (*Lamia*) (Tonkin, China).

octomaculata FABRICIUS, 1792, Ent. Syst., 1, 2: 290 (*Lamia*) (India).

Distr.: Taiwan; India, Assam, Peninsula of SE. Asia, Sunda Is., Tonkin, China, Hainan I., Korea.

subsp. *rubus* (LINNÉ, 1758) s. str. 無花果天牛

LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10: 390 (*Cerambyx*) (India).

Distr.: Taiwan; India, Assam, Peninsula of SE. Asia, Sunda Is., Tonkin, China, Hainan I., Korea.

subsp. *albofasciata* (DE GEER, 1775) 白條無花果天牛

DE GEER, 1775, Mem. Ins., 5: 106, pl. 13, f. 16 (*Cerambyx*) (E. Indies).

Distr.: Taiwan; E. Indies.

B. ushijimai N. OBHAYASHI, 1981 牛島氏大天牛

N. OHBAYASHI, 1981, Ent. Rev. Japan, 35(1/2): 47 (Musha).

Distr.: Taiwan.

Genus *Apriona* CHEVROLAT, 1852 桑天牛屬

Apriona CHEVROLAT, 1852, Rev. Mag. Zool., (2)4: 414 (Type-species: *Lamia germari* HOPE, 1831).

Apriona rugicollis CHEVROLAT, 1852 桑天牛

CHEVROLAT, 1852, Rev. Mag. Zool., (2)4: 418 (Shanghai).

plicicollis MOTSCHULSKY, 1853, Etudes Ent., 2: 48 (N. China).

germari: MATSUSHITA (nec HOPE), 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 337.

Distr.: Taiwan; China, Assam, Korea, Hainan I., Indochina, Burma, India.

Tribe Ancyronotini 胡斑天牛族

Genus *Palimna* PASCOE, 1862 長角胡斑天牛屬

Palimna PASCOE, 1862, J. Ent., 1: 346 (Type-species: *Golsinda tessellata* PASCOE, 1857 = *Cerambyx annulatus* OLIVIER, 1792).

Cylanca THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 58, 132, 484 (Type-species: *Golsinda tessellata* PASCOE, 1857).

Goniages PASCOE, 1865, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 135 (Type-species: *G. infausta* PASCOE, 1865).

Apalimna BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 241 (Type-species: *A. liturata* BATES, 1884).

Palimna formosana (KANO, 1933) 臺灣長角胡斑天牛

KANO, 1933, Kontyû, 6: 282 (*Apalimna*) (Musha: Kyuhabon).

Distr.: Taiwan.

P. palimnoides (SCHWARZER, 1925)

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 62 (*Apalimna*) (Fuhosho, Hozan, Kosempo et Taihorin).

Distr.: Taiwan; S. China, Hainan I., Laos, Bhutan, Sikkim, N. India.

- subsp. *palimnoides* (SCHWARZER, 1925) s. str. 蜘蛛形長角天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 62 (*Apalimna*) (Kosempo et Taihorin).
 Distr.: Taiwan.; S. China, Laos, Bhutan, Sikkim, N. India.

Tribe Crossotini 紅斑天牛族

Genus *Moechotypa* THOMSON, 1864 艷天牛屬

- Moechotypa* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., pp. 55, 368 (Type-species: *M. arida* THOMSON, 1864=*Niphona suffusa* PASCOE, 1862).
Scotinauges PASCOE, 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)8: 277 (Type-species: *Scotinauges diphysis* PASCOE, 1871).
Tylophorus BLESSIG, 1873, Trudy Russk. Ent. Obshch., 9: 213 (Type-species: *Tylophorus wulffiusi* BLESSIG, 1873).
Moechotypa delicatula (WHITE, 1858) 阿薩姆艷天牛
 WHITE, 1858, Ann. Mag. Nat. Hist., (3)2: 268 (*Nyphona*) (Assam (Sylhet)).
suffusa var. *elongata* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 44: 29 (India).
 Distr.: Taiwan(?); S. China, Sumatra, Assam, India, Burma, Laos, Tonkin.
M. formosana (PIC, 1917) 埔里艷天牛
 PIC, 1917, Mel. Exot.-Ent., 26: 7 (*Hecyrida*) (Taiwan).
 Distr.: Taiwan.

Tribe Xylorhizini 縱條天牛族

Genus *Xylorhiza* CASTELNAU, 1840 縱條天牛屬

- Xylorhiza* CASTELNAU, 1840, Hist. Nat. Col., 2: 476 (Type-species: *X. venosa* CASTELNAU, 1840=*X. adusta* WIEDEMANN, 1819).
Xylorhiza adusta (WIEDEMANN, 1819) 臺灣縱條天牛
 WIEDEMANN, 1819, Zool. Mag., (1)3: 182 (*Lamia*) (Bengal).
venosa CASTELNAU, 1840, Hist. Nat. Col., 2: 476 (Peninsula of SE. Asia).
 Distr.: Taiwan(?); Bengal, Burma, Peninsula of SE. Asia, S. China, Hainan I.

Genus *Microxylorhiza* HAYASHI, 1974 矮縱條天牛屬

- Microxylorhiza* HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 38 (Type-species: *M. matsudai* HAYASHI, 1974).
Microxylorhiza matsudai HAYASHI, 1974 松田氏矮縱條天牛
 HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 39 (Sungkang).
 Distr.: Taiwan.

Tribe Dorcaschematini 白天牛族

Genus *Olenecamptus* CHEVROLAT, 1835 白天牛屬

- Olenecamptus* CHEVROLAT, 1835, Mag. Zool., 5: 134 (Type-species: *O. serratus* CHEVROLAT, 1835).

- Authades* THOMSON, 1857, Archives Ent., 1: 191 (Type-species: *A. indianus* THOMSON, 1857).
- Ibidimorphum* MOTSCHULSKY, 1860, Schrenck's Reisen Amurl. Col., p. 153 (Type-species: *I. octopustulatum* MOTSCHULSKY, 1860).
- Olenecamptus bilobus* (FABRICIUS, 1801) 六星白天牛
FABRICIUS, 1801, Syst. Eleuth., 2: 324 (*Saperda*) ("Insulis oceani australis" = Northern Australia).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), Philippines, Borneo, Java, Andaman I., Nias I., Seychelles I., Laos, Sri Lanka, Caroline I., Mariana I., Molucca, New Guinea, New Britain, I. N. Australia.
- O. indianus* (THOMSON, 1857) 印度白天牛
THOMSON, 1857, Archiv. Ent., 1: 192 (*Authades*) (India).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), China, Tonkin, Burma, Laos, Sri Lanka, India, Sikkim, Nepal.
- O. cretaceus* BATES, 1873
BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 314 (Japan).
Distr.: Taiwan; Japan, E. China, Korea.
subsp. *marginatus* SCHWARZER, 1925 大狹胸白天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 63 (*O. marginatus*) (Kosempo).
Distr.: Taiwan.
- O. formosanus* PIC, 1914 蓬萊狹胸白天牛
PIC, 1914, Mat. Long., 9(1): 19 (Taiwan).
decemmaculatus PIC, 1916, Mat. Long., 10(1): 13 (Hanoi, Tonkin).
Distr.: Taiwan; Japan, N. Vietnam.

Genus *Microlenecamptus* PIC, 1925 姬白天牛屬

- Microlenecamptus* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 43: 22 (*Cylindropomus* subg.) (Type-species: *C. (M.) albonotatus* PIC, 1925).
- Microlenecamptus obsoletus* (FAIRMAIRE, 1888) 蒼藍蛇紋天牛
FAIRMAIRE, 1888, Revue d'Ent., 7: 146 (*Olenecamptus*) (China).
albatus MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 353 (*Dorcaschema*) (Taihorin).
Distr.: Taiwan; China.
- M. biocellatus* (SCHWARZER, 1925) 蛇紋天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 63 (*Olenecamptus*) (Kankau).
virescens SAVIO, 1929, Notes d'Ent. Chinoise, 1, 2: 8, f. 6 (*Olenecamptus*) (China).
Distr.: Taiwan; E. China.

Tribe *Xenoleini* 霜斑長角天牛族

Genus *Xenolea* THOMSON, 1864 霜斑長角天牛屬

- Xenolea* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 91 (Type-species: *X. collaris* THOMSON, 1864).

- Aeschopalea* PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 24 (Type-species: *A. agraria* PASCOE, 1864).
- Xenolea asiatica* (PIC, 1925) 亞洲長角天牛
PIC, 1925, Echange, 40(41): 16 (*Aeschopalea*) (Tonkin).
Distr.: Taiwan; Japan, S. China; Hainan; Indo-China, India.
- X. collaris* THOMSON, 1864
THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 92 (*Brunnea*).
Distr.: Taiwan; Borneo.
- subsp. *formosana* BREUNING, 1965 蓬萊長角天牛
BREUNING, 1965, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 41: 177.
Distr.: Taiwan.

Tribe Rhodopinini 瘤角天牛族

Genus *Rhodopina* GRESSITT, 1951 瘤角天牛屬

- Rhodopina* GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 439 (n. n. pro. *Rhodopis* THOMSON, 1857).
Rhodopis THOMSON, 1857, Archives Ent., 1: 174 (Type-species: *Rhodopis pubera* THOMSON, 1857).
- R. formosana* (BREUNING, 1954) 蓬萊瘤角天牛
BREUNING, 1954, Bull. Inst. Sci. Nat. Belg., 30(28): 5 (*Rhodopis*) (Hori).
Distr.: Taiwan.
- R. subuniformis* GRESSITT, 1951 八仙瘤角天牛
GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 440, pl. 18, f. 3 (Shin-Hassenzan).
Distr.: Taiwan.

Genus *Euseboides* GAHAN, 1893 尾片天牛屬

- Euseboides* GAHAN, 1893, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)11: 385 (Type-species: *E. plagiatus* GAHAN, 1893).
- Euseboides matsudai* GRESSITT, 1938
GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 163, pl. 1, f. (Hori)
Distr.: Taiwan; Hainan I.
- subsp. *matsudai* GRESSITT, 1938, s. str. 松田氏三帶天牛
GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 163, pl. 1, f. 2 (Hori).
plagiatus KANO (nec GAHAN), 1928, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 18: 408
(Karenko et Koshun).
Distr.: Taiwan.

Genus *Diboma* THOMSON, 1864 琉球鏽天牛屬

- Diboma* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 46 (Type-species: *D. tranquilla* THOMSON, 1864).
- Zotalemimon* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 43: 29 (Type-species: *Z. apicale* PIC, 1925=*Sybra posticata* GAHAN, 1895).

Donyisia GRESSITT, 1940, Philip. J. Sci., 72(1/2): 179 (Type-species: *Sydonia costata* MATSUSHITA, 1933).

Sybrocetrura BREUNING, 1947, Ark. Zool., 39A(6): 57 (Type-species: *S. obscura* BREUNING, 1947 = *Sydonia ropicooides* GRESSITT, 1939).

Diboma costata (MATSUSHITA, 1933) 琉球锈天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 379, pl. 5, f. 1 (*Sydonia*) (Japan (Ryukyu Is.)).

loochooana BREUNING, 1940, Folia Zool. Hydrobiol., 10: 78 (Japan (Ryukyu Is.)).

Distr.: Taiwan; Japan, Hainan I., China.

Genus *Taiwanajinga* HAYASHI, 1978 臺灣瘤角天牛屬

Taiwanajinga HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 109 (Type-species: *T. albofasciata* HAYASHI, 1978).

Taiwanajinga albofasciata HAYASHI, 1978 蓮華白條锈天牛

HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 110 (Balengshe, Nanshanchi, Lienhwachi).

Distr.: Taiwan.

Genus *Doius* MATSUSHITA, 1933 土井氏锈天牛屬

Doius MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 380 (Type-species: *D. rufescens* MATSUSHITA, 1933).

Doius fukudai HAYASHI, 1969 福田氏锈天牛

HAYASHI, 1969, Ent. Rev. Japan, 21(2): 65 (Shokoo (Matsuoka) nr. Musha).

Distr.: Taiwan.

Genus *Mimectatina* AURIVILLIUS, 1928 深褐锈天牛屬

Mimectatina AURIVILLIUS, 1928, Ark. Zool., 19A(23): 27 (Type-species: *M. singularis* AURIVILLIUS, 1927).

Nipposybra BREUNING, 1939, Festschr. 60 Geburtst. E. Strand, 5: 280 (Type-species: *N. fuscoplagiata* BREUNING, 1939).

Parasydonia BREUNING, 1949, Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg., 25(38): 24 (Type-species: *Sydonia divaricata* BATES, 1884).

Falsodoius BREUNING, 1953, Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg., 29(8): 16 (Type-species: *Doius meridianus* MATSUSHITA, 1933).

Mimectatina meridiana (MATSUSHITA, 1933) 深褐锈天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 380, pl. 4, f. 8 (*Doius*) (Hozan).

Distr.: Taiwan.

M. murakamii HAYASHI, 1978 村上氏锈天牛

HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 32(1/2): 111 (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

Genus *Graphidessa* BATES, 1884 網紋锈天牛屬

Graphidessa BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 248 (Type-species: *G. venata* BATES, 1884).

Graphidessa obliquefasciata KOMIYA et KUSAMA, 1973 斜紋銹天牛
KOMIYA et KUSAMA, 1973, Rep. Fac. Soc. Shizuoka Univ., 8: 138, pl. 1 (Sungkang).
Distr.: Taiwan.

G. variegata HAYASHI, 1974 梨山銹天牛
HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 50 (Lishan in Tachiachi).
Distr.: Taiwan.

Genus *Pseudanaesthetis* PIC, 1922 擬褐翅天牛屬

Pseudanaesthetic PIC, 1922, Melang Exot.-Ent., 37: 15 (Type-species: *P. langana* PIC).
? *Hirayamaia* MATSUSHITA (nec MARUNO), 1937, Kontyû, 11: 103 (Type-species: *H. fusciorufa* MATSUSHITA, 1937).

Falsoterinaea MATSUSHITA, 1938, Kontyû, 12: 95 (n. n. for *Hirayamaia* MATSUSHITA, 1937).

Pseudanaesthetis mizunumai HAYASHI, 1974 望洋平山天牛
HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 48 (Mareppa).
Distr.: Taiwan.

P. rufipennis (MATSUSHITA, 1933) 紅翅平山天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 377, pl. 5, f. 3 (*Eupogonius*)
(Taihoku).
fusciorufa MATSUSHITA, 1937, Kontyû, 11: 103 (?*Hirayamaia*) (Musha).
Distr.: Taiwan.

Genus *Anaesthetobrium* PIC, 1923 黑胸褐翅天牛屬

Anaesthetobrium PIC, 1923, Melang Exot.-Ent., 40: 20 (Type-species: *A. luteipenne* PIC, 1923).

Paraphidora (*Maraphidola*) MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 377
(Type-species: *P. fuscoflava* MATSUSHITA, 1933).

Anaesthetobrium fuscoflavum (MATSUSHITA, 1933) 黑胸褐翅天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 377, pl. 4, f. 4 (*Paraphidora*)
(Taiwan).
Distr.: Taiwan.

Genus *Cylindilla* BATES, 1844 稜頸天牛屬

Cylindilla BATES, 1844, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 250 (Type-species: *C. grisescens* BATES, 1844).

Nicroestola GRESSITT, 1940, Philip. J. Sci., 72(1/2): 180 (Type-species: *M. bidentata* GRESSITT, 1940).

Cylindilla formosana (GRESSITT, 1951) 蓬萊稜頸天牛
GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 513 (*Microestola*) (Arisan).
Distr.: Taiwan.

Genus *Penthides* MATSUSHITA, 1933 黃粗毛天牛屬

Penthides MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34(2): 430 (Type-species: *P. flavus* MATSUSHITA, 1933).

Hirakura HAYASHI, 1957, Ent. Rev. Japan, 8(2): 47 (Type-species: *H. rufoflava* HAYASHI, 1957).

Penthides flavus MATSUSHITA, 1933

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34(2): 431, pl. 5, f. 8 (Baibara).
Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

subsp. *flavus* MATSUSHITA, 1933, s. str. 黑角黃天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34(2): 432, pl. 5, f. 8 (Baibara).
Distr.: Taiwan.

Genus *Miccolamia* BATES, 1884 微北海天牛屬

Miccolamia BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 253 (Type-species: *M. cleroides* BATES, 1884).

Miccolamia castaneoverrucosa HAYASHI, 1974 褐微瘤天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 52 (Sungkang).
Distr.: Taiwan.

M. albosetosa GRESSITT, 1951 白毛微瘤天牛

GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 533 (Shinsui).
Distr.: Taiwan.

Tribe Hebestolini 鹿角天牛族

Genus *Cervoglenea* GRESSITT, 1951 鹿角白星天牛屬

Cervoglenea GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 621 (Type-species: ?*Glenea lata* GRESSITT, 1935).

Cervoglenea lata (GRESSITT, 1935) 粗星天牛

GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 191 (?*Glenea*) (Kuraru).
Distr.: Taiwan.

Tribe Acanthocinini 白楊粗腿天牛族

Genus *Leiops* SERVILLE, 1835 星斑寬腿天牛屬

Leiops SERVILLE, 1835, Ann. Soc. Ent. France, 4: 86 (Type-species: *Cerambyx nebulosus* LINNÉ, 1758).

Leiops shibatai HAYASHI, 1974 柴田氏寬腿天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 58 (Sungkang).
Distr.: Taiwan.

Genus *Neacanista* GRESSITT, 1940 偽長角寬腿天牛屬

Neacanista GRESSITT, 1940, Philip. J. Sci., 72: 182 (Type-species: *N. tuberculipennis* GRESSITT, 1940).

Neacanista shirakii (MITONO, 1943) 素木氏寬腿天牛

MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33: 584, f. 2 (*Acanthocinus*) (Hassenzan: Reimei).

Distr.: Taiwan.

Genus *Acanthocinus* GUERIN, 1826 白楊粗腿天牛屬

- Acanthocinus* GUERIN, 1826, Dist. Class. D'Hist. Nat., 9: 186 (Type-species: *Cerambyx aedilis* LINNÉ, 1767).
Astynomus DEJEAN, 1835, Cat. Col. (ed. 2), p. 337 (n. n.).
Aedilis SERVILLE, 1835, Ann. Soc. Ent. France, 4: 32 (Type-species: *A. montanus* SERVILLE, 1835=*Cerambyx aedilis* LINNÉ, 1758).
Astynomus STEPHENS, 1839, Man. Brit. Col., p. 269 (Type-species: *Cerambyx aedilis* LINNÉ, 1758).
Acanthocinus gundaiensis KANO, 1933 郡大粗腿天牛
 KANO, 1933, Kontyû, 6: 285 (Gundaisha nr. Mt. Morison).
 Distr.: Taiwan.

Gens *Ostedes* PASCOE, 1859 挺胸粗腿天牛屬

- Ostedes* PASCOE, 1859, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 43 (Type-species: *O. pauperata* PASCOE, 1859).
Ostedes inermis SCHWARZER, 1925
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 146 (Alikang, Hozan).
nubila MATSUSHITA, 1931, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17: 405 (Hozan, Taihorin).
 Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.), S. China, Hainan I.
 subsp. *inermis* SCHWARZER, 1925 黑紋挺胸粗腿天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 146 (Alikang, Hozan).
 Distr.: Taiwan.
O. subfasciata MATSUSHITA, 1933 挺胸粗腿天牛
 MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 392, pl. 4, f. 9 (Baibara).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Clytosemia* BATES, 1884 叉紋黑天牛屬

- Clytosemia* BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 253 (Type-species: *C. pulchra* BATES, 1884).
Clytosemia bicincta GRESSITT, 1938 雙點長條天牛
 GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 164, pl. 1, f. 3 (Sakahan nr. Karenko).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Rondibilis* THOMSON, 1857 粗腿刺翅天牛屬

- Rondibilis* THOMSON, 1857, Archives Ent., 1: 306 (Type-species: *R. bispinosa* THOMSON, 1857).
Polimeta PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 13 (Type-species: *Ostedes spinosula* PASCOE, 1860).
Rondibilis femorata GRESSITT, 1938 欠紋刺翅天牛
 GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 165, pl. 1, f. 1 (Rokki).
 Distr.: Taiwan.
R. horiensis KANO, 1933

KANO, 1933, Kontyû, 6: 285 (Hori).

Distr.: Taiwan; China.

subsp. *horienis* KANO, 1933 s. str. 埔里刺翅天牛

KANO, 1933, Kontyû, 6: 285 (Hori).

Distr.: Taiwan.

R. semielongatus HAYASHI, 1974 六龜刺翅天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 53 (Liukuei).

Distr.: Taiwan.

Genus *Euryclytosemia* HAYASHI, 1963 寬叉紋黑天牛屬

Euryclytosemia HAYASHI, 1963, Ent. Rev. Japan, 16(1): 15 (Type-species: *C. nomurai* HAYASHI, 1963).

Euryclytosemia nomurai HAYASHI, 1963 野村氏刺翅天牛

HAYASHI, 1963, Ent. Rev. Japan, 16(1): 15, pl. 2, f. 10 (Japan (Yonaguni I)).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.); Japan (Yonaguni I.).

Genus *Sophronica* BLANCHARD, 1845 水蠟銹天牛屬

Sophronica BLANCHARD, 1845, Hist. Nat. Ins., 2: 160 (Type-species: *S. carbonaria* PASCOE, 1864).

Dasyo PASCOE, 1858, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 253 (Type-species: *D. lineata* PASCOE, 1858).

Elithiotes PASCOE, 1864, J. Ent., 2: 279 (Type-species: *E. hirsuta* PASCOE, 1864).

Lasiapheles BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: (Type-species: *L. obrioides* BATES, 1873).

Dasystola KOLBE, 1894, Stettin. Ent. Ztg., 55: 63 (Type-species: *D. hirta* KOLBE, 1894).

Phunginus PIC, 1922, Melang Exot.-Ent., 37: 15 (Type-species: *P. apicalis* PIC, 1922).

Mimanaesthetis PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 47: 16 (Type-species: *M. atripennis* PIC, 1926).

Eupogonioides FISHER, 1930, Indian Forest Rec., 14: 275 (Type-species: *E. gardneri* FISHER, 1930=*Phunginus apicalis* PIC, 1922).

Sophronica obrioides (BATES, 1873) 水蠟銹天牛

BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 382 (Japan).

Distr.: Taiwan; Japan.

Genus *Anaespogonius* GRESSITT, 1938 寬胸瘤角天牛屬

Anaespogonius GRESSITT, 1938, Lingnan Sci. J., 17: 53 (Type-species: *A. fulvus* GRESSITT, 1938).

Anaespogonius ochraceofulvus HAYASHI 1974 寬胸瘤角天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 49 (Taichung).

Distr.: Taiwan.

Genus *Myrmexocentrus* BREUNING, 1957 蟻型天牛屬

Myrmexocentrus BREUNING, 1957, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 33, 8: 20 (Type-species: *M. tibialis* BREUNING, 1957).

Myrmexocentrus quadrimaculatus HAYASHI, 1983 四紋蟻型天牛

HAYASHI, 1983, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 16: 43 (Kenting Park).

Distr.: Taiwan.

Genus *Eryssamena* BATES, 1884 刺翅天牛屬

Eryssamena BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 251 (Type-species: *E. saperdina* BATES, 1884).

Eryssamena taiwana HAYASHI, 1974 臺灣刺翅天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 54 (Fenchiho).

Distr.: Taiwan.

E. shibatai HAYASHI, 1974 柴田氏細條天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 55 (Fenchiho).

Distr.: Taiwan.

Genus *Neoeryssamena* HAYASHI, 1974 新刺翅天牛屬

Neoeryssamena HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 56 (Type-species: *N. mitonoana* HAYASHI, 1974).

Neoeryssamena mitonoana HAYASHI, 1974 水戶野氏細條天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 56 (Wushe).

Distr.: Taiwan.

Genus *Eoporis* PASCOE, 1864 灰粗腿天牛屬

Eoporis PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 15 (Type-species: *E. elegans* PASCOE, 1864).

Subgenus *Eoporimimus* SCHWARZER, 1925

Eoporimimus SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 147 (Type-species: *E. bifasciana* SCHWARZER, 1925).

Eoporis (Eoporimimus) simillima HAYASHI, 1974 南山灰粗腿天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 57 (Nanshanchi).

Distr.: Taiwan.

E. (E.) mitonoi (SEKI, 1946) 水戶野氏灰粗腿天牛

SEKI, 1949, Ins. World, L: 573, f. (*Rondibilis*) (Mt. Hinoki).

Distr.: Taiwan.

E. (E.) bifasciana SCHWARZER, 1925 雙彩灰粗腿天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 147 (Sokutsu).

Distr.: Taiwan.

E. (E.) differens PIC, 1926 寮國灰粗腿天牛

PIC, 1926, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 143.

Distr.: Taiwan; China, India, N. Vietnam, Laos.

Genus *Exocentrus* MULSANT, 1839 粗毛瑣天牛屬

Exocentrus MULSANT, 1839, Col. France Long., p. 152 (Type-species: *Cerambyx lusitanus* LINNÉ, 1767).

- Camptomyne* PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)131: 27, 43 (Type-species: *C. callioides* PASCOE, 1864).
- Oligopsis* THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 111 (Type-species: *O. exocentroides* THOMSON, 1864).
- Ispaterus* FAIRMAIRE, 1892, Revue Ent., 11: 122 (Type-species: *Ispaterus longipilis* FAIRMAIRE, 1892).
- Pseudocentrus* FAIRMAIRE, 1901, Revue Ent., 20: 230 (Type-species: *P. lineellus* FAIRMAIRE, 1901=*Exocentrus reticulatus* FAIRMAIRE, 1896).
- E. alboguttatus* FISHER, 1925
FISHER, 1925, Philip. J. Sci., 28(2): 240.
Distr.: Taiwan; Hainan I., Bhutan, Andaman I., Sumatra, Laos, Tonkin, China.
subsp. *taiwanensis* KUSAMA et TAHIRA, 1978 白星瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 22 (Liukuei).
Distr.: Taiwan.
- E. brevisetosus* GRESSITT, 1938 縮毛瑣天牛
GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 167, pl. 1, f. 4 (*E. testudineus* subsp.) (Bukai).
Distr.: Taiwan; W. China.
- E. formosofasciolatus* KUSAMA et TAHIRA, 1978 細帶瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 17 (Nanshanchi).
Distr.: Taiwan.
- E. fulvobrunneus* KUSAMA et TAHIRA, 1978 枯草瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 15 (Roshan).
Distr.: Taiwan.
- E. immaculatus* GRESSITT, 1951 欠紋瑣天牛
GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 525, 529 (Kuraru).
Distr.: Taiwan.
- E. kentingensis* KUSAMA et TAHIRA, 1978 墾丁瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 12 (nr. Kenting Park).
Distr.: Taiwan.
- E. nanshanensis* KUSAMA et TAHIRA, 1978 南山瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 14 (Nanshanchi).
Distr.: Taiwan.
- E. pseudovariepennis* KUSAMA et TAHIRA, 1978 廬山多紋瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 18 (Roshan).
Distr.: Taiwan.
- E. rufithorax* GRESSITT, 1935 紅胸瑣天牛
GRESSITT, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 236 (Pianan-Ambu).
Distr.: Taiwan.
- E. savioi* PIC, 1925 短翅瑣天牛
PIC, 1925, Bull. Soc. Ent. France, p. 138 (*E. curtipennis* var. *savioi*) (China).
Distr.: Taiwan; E. China.

- E. seriatomaculatus* SCHWARZER, 1925 後紋圓瑣天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 147 (Kankau).
Distr.: Taiwan.
- E. taniguchii* MAKIHARA, 1986 谷口氏瑣天牛
MAKIHARA, 1986, Mis. Rep. Hiwa Mus. Nat. Hist., 24: 13 (Lanyu I.).
Distr.: Taiwan (Lanyu I.).
- E. variepennis* (SCHWARZER, 1925) 斑翅瑣天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 147 (*Camptomys*?) (Kankau).
Distr.: Taiwan.
- E. venatoides* KUSAMA et TAHIRA, 1978 梅峯瑣天牛
KUSAMA et TAHIRA, 1978, Elytra, 6(1): 10 (nr. Meifeng).
Distr.: Taiwan.

Genus *Sciades* PASCOE, 1864 刺胸天牛屬

Sciades PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 27, 30 (Type-species: *Leiopus suffusus* PASCOE, 1859).

Subgenus *Estoliops* MATSUSHITA, 1943

Estoliops MATSUSHITA, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33(242/243): 574 (Type-species: *E. fasciatus* MATSUSHITA, 1943).

Sciades (*Estoliops*) *fasciatus* (MATSUSHITA, 1943)

MATSUSHITA, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 33(242/243): 575, f. 3 (*Estoliops*) (Japan).

Distr.: Taiwan; Japan.

subsp. *taiwanensis* KUSAMA et ODA, 1978 黑帶刺胸天牛

KUSAMA et ODA, 1978, Rep. Fac. Soc. Shizuoka Univ., 13: 76, pl. 1, f. 4 (*Estoriops*) (Hui-sun Exp. Forest).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Miaenia* PASCOE, 1864

Miaenia PASCOE, 1864, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 27 (Type-species: *M. marmorea* PASCOE, 1864).

S. (Miaenia) botelensis (GRESSITT, 1951) 紅頭瑣天牛

GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 531 (*Nonymoides*) (Lanyu I.).

Distr.: Taiwan (Lanyu I.).

S. (Miaenia) subfasciata (SCHWARZER, 1925) 灰帶瑣天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 148 (*Miaenia*) (Sokutsu).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Granulimiaenia* BREUNING, 1977

BREUNING, 1977, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 53(1): 241, 159 (Type-species: *Miaenia granulicollis* GRESSITT, 1938).

S. (Granulimiaenia) granulicollis (GRESSITT, 1938) 裸胸瑣天牛

GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 166, pl. 1, f. 5 (*Miaenia*) (Kuraru).

Distr.: Taiwan; S. China.

S. (G.) changi (KUSAMA et ODA, 1975) 張氏瑣天牛

KUSAMA et ODA, 1975, Rep. Fac. Soc. Shizuoka Univ., 13: 75 pl. 1, f. 3 (*Miaenia*)
(Hui-Sun Exp. Forest).

Distr.: Taiwan.

Tribe Astathini 藍艷天牛族

Genus *Cleonaria* THOMSON, 1864 藍艷黃天牛屬

Cleonaria THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 119 (Type-species: *C. bicolor* THOMSON, 1864).

Cleonaria taiwana HAYASHI, 1984 瑞穗黃天牛

HAYASHI, 1984, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 17/18: 36, pl. 2, f. 9 (Juisui).

Distr.: Taiwan.

Genus *Bacchisa* PASCOE, 1867 琉璃天牛屬

Bacchisa PASCOE, 1867, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 329, 342 (Type-species: *B. coronata* PASCOE, 1867).

Bacchisa atritarsis (PIC, 1912) 臺灣琉璃天牛

PIC, 1912, Mat. Long. 8, 2: 21 (*Chreonoma*) (China?).

Distr.: Taiwan; China.

B. fortunei (THOMSON, 1857)

THOMSON, 1857, Archives Ent., 1: 58, pl. 6, f. 2 (*Plaxomicrus*) (China).

Distr.: Taiwan; China, Korea, Japan.

subsp. *flavicornis* KANO, 1933 福晉氏琉璃天牛

KANO, 1933, Kontyû, 6: 291 (*Chreonoma fortunei* subsp. *flavicornis*) (Urai).

Distr.: Taiwan.

Genus *Anastathes* GAHAN, 1901 四紋黃天牛屬

Anastathes GAHAN, 1901, Trans. Ent. Soc. London, p. 60 (Type-species: *Astathes nigricornis* THOMSON, 1865).

Anastathes parva GRESSITT, 1935

GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 193 (Bukai et Hori).

Distr.: Taiwan; China, Hainan I.

subsp. *parva* GRESSITT, 1935, s. str. 四紋黃天牛

GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 193 (Bukai et Hori).

Distr.: Taiwan.

Genus *Astathes* NEWMAN, 1842 藍艷天牛屬

Astathes NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 299 (Type-species: *A. perplexa* NEWMAN, 1842).

Astathes episcopalis CHEVROLAT, 1852 大紫天牛

CHEVROLAT, 1852, Revue Zool., (2): 418 (China).

Distr.: Taiwan; China.

- A. formosana* BREUNING, 1956 蓬萊紫天牛
BREUNING, 1956, Longicornia, 3: 499 (Taihoku).
Distr.: Taiwan.
- A. janthinipennis* FAIRMAIRE, 1895
FAIRMAIRE, 1895, Ann. Soc. Ent. Belg., 39: 187.
Distr.: Taiwan; Tonkin, Hainan I., China.
- subsp. *cyanoptera* GAHAN, 1900 紅翅紫天牛
GAHAN, 1900, Ann. Mag. Nat. Hist., (7)5: 353 (Hainan).
Distr.: Taiwan.

Tribe Saperdini 多星天牛族

Genus *Thyestilla* AURIVILLIUS, 1923 大麻天牛屬

- Thyestilla* AURIVILLIUS, 1923, Col. Cat., 74: 491 (n. n. pro. *Thyestes* THOMSON, 1864)
(Type-species: *T. pubescens* THOMSON, 1864).
- Thyestilla gebleri* (FALDERMANN, 1835) 大麻天牛
FALDERMANN, 1835, Mem. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 434, pl. 5, f. 6 (*Saperda*) (N. China).
pubescens THOMSON, 1864, Syst. Ceramb., p. 116 (*Thyestes*) (Japan).
funebri GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 67 (*Thyestes*) (China).
infernalis PIC, 1904, Echange, 10(231): 17 (*Phytoecia*) (Amur).
Lepesmei GILMOUR, 1950, Longicornia, 1: 554, f. 10 (China).
curtipennis PIC, 1952, Div. Ent., 11: 5 (*Phytoecia*).
gebleri ssp. *kadowakii* FUJIMURA, 1962, Kontyû, 30(3): 211, pl. 13, f. 26 (Japan (Okinawa Is.)).
Distr.: Taiwan(?); Japan, Korea, Siberia.

Genus *Glenida* GAHAN, 1888 多星妮天牛屬

- Glenida* GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 65 (Type-species: *G. suffusa* GAHAN, 1888).
- Glenida cyanipennis* GAHAN, 1888 藍翅妮天牛
GAHAN, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)2: 66 (China).
Distr.: Taiwan; S. China, Hainan I.

Genus *Mandibularia* PIC, 1925 巨顎天牛屬

- Mandibularia* PIC, 1925, Melang Exot.-Ent., 43: 24 (Type-species: *M. nigriceps* PIC, 1925).
- Mandibularia quadricolor* GRESSITT, 1951 多彩巨顎天牛
GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 561, pl. 21, f. 4 (SE. China).
Distr.: Taiwan; China.

Genus *Serixia* PASCOE, 1856 細角多星天牛屬

- Serixia* PASCOE, 1856, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 45 (Type-species: *S. apicalis* PASCOE, 1856).

- Serixia albopleura* GRESSITT, 1935 白側細角天牛
 GRESSITT, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 291 (Hassenzan).
 Distr.: Taiwan.
- S. botelensis* KANO, 1933 蘭嶼細角天牛
 KANO, 1933, Kontyû, 6: 288 (Lanyu I.).
 Distr.: Taiwan (Lanyu I.).
- S. kisana* (MATSUSHITA, 1937) 旗山細角天牛
 MATSUSHITA, 1937, Kontyû, 11: 105 (*Neopraolea*) (Kisan).
 ?*longicornis* SCHWARZER (nec PASCOE), 1925, Ent. Blaett., 21: 149 (Kankau).
subsericea GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 170, pl. 1, f. 11 (Kurarû).
 Distr.: Taiwan.
- S. signaticornis* SCHWARZER, 1925 環節細角天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 149 (Kankau).
 Distr.: Taiwan.
- S. testaceicollis* KANO, 1933 褐胸細角天牛
 KANO, 1933, Kontyû, 6: 287 (Urai).
 Distr.: Taiwan.
- S. hayashii*, HAYASHI, 1974 林氏細角天牛
 HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 60 (Nanshanchi).
 Distr.: Taiwan.
- S. juisuiensis* HAYASHI, 1974 瑞穗細角天牛
 HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 61 (Juisui).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Praolia* BATES, 1884 長角藍艷天牛屬

- Praolia* BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 261 (Type-species: *P. citrinipes* BATES, 1884).
- Praolia atripennis* (PIC, 1923) 黑翅細角天牛
 PIC, 1923, Melang Exot.-Ent., 40: 20 (*Serixia*) (Taiwan).
griseipennis GRESSITT, 1938, Philip. J. Sci., 65: 169, pl. 1, f. 8, (*Serixia*) (Karenko: Sakahen).
 Distr.: Taiwan.
- P. citrinipes* BATES, 1884 藍艷細角天牛
 BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 261, pl. 2, f. 8 (Japan).
 Distr.: Taiwan(?); Japan.

Genus *Neoserixia* SCHWARZER, 1925 長頸黃天牛屬

- Neoserixia* SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 148 (Type-species: *N. pulchra* SCHWARZER, 1925).
- Subgenus *Neoserixia* SCHWARZER, 1925, s. str.
- Neoserixia* (*Neoserixia*) *longicollis* GRESSITT, 1935 長頸黃天牛
 GRESSITT, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 287 (Rokki: Chirifu).
 Distr.: Taiwan.

N. (N.) infasciatus GRESSITT, 1935 姬長頸黃天牛
 GRESSITT, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 289 (*N. longicollis* subsp. *infasciatus*) (Hassenzan, Bukai).

Distr.: Taiwan.

N. (N.) pulchra SCHWARZER, 1925 港口黃天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 148 (Kankau, Banshoryo).

Distr.: Taiwan; S. China.

subsp. *pulchra* SCHWARZER, 1925, s. str.

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 148 (Kankau, Banshoryo).

Distr.: Taiwan.

N. (N.) schwarzeri GRESSITT, 1935 舒瓦氏黃天牛

GRESSITT, 1935, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 25: 289 (Sakahen-Higashinoko).

Distr.: Taiwan.

Subgenus *Neopraolia* MATSUSHITA, 1933

Neopraolia MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 406 (Type-species: *Neoserixia delicata* MATSUSHITA, 1933).

Neoserixia (Neopraolia) delicata MATSUSHITA, 1933 鳳山細角天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 406 (*Neopraolia*) (Hozan).

Distr.: Taiwan.

Genus *Menesia* MULSANT, 1856 黃紋天牛屬

Menesia MULSANT, 1856, Ann. Soc. Linn. Lyon, (2)3: 157 (Type-species: *M. perrisi* MULSANT, 1856=*Saperda bipunctata* ZOEBKOFF, 1829).

Daphisia PASCOE, 1867, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 363, 418 (Type-species: *D. pulchella* PASCOE, 1867).

Menesia matsudai HAYASHI, 1985 松田氏黃紋天牛

HAYASHI, 1985, Ent. Rev. Japan, 40(2): 135 (Lienhwachi).

Distr.: Taiwan.

Genus *Paramenesia* BREUNING, 1952 似黃紋天牛屬

Paramenesia BREUNING, 1952, Ent. Arb. Mus. Georg. Frey, 3: 135 (Type-species: *P. theaphia* BATES, 1884).

Paramenesia kasugensis (SEKI et KOBAYASHI, 1935) 春日黃紋天牛

SEKI et KOBAYASHI, 1935, Ent. Wld. Tokyo, 3(16): 225, f. (*Glenea*) (Japan).

Distr.: Taiwan (new record: Baikei, 25 VI 1939).

Genus *Eutetrappa* BATES, 1884 華夏天牛屬

Eutetrappa BATES, 1884, J. Linn. Soc. London (Zool.), 18: 256 (Type-species: *E. variicornis* BATES, 1884=*Saperda sedecimpunctata* MOTSCHULSKY, 1860).

Saperda ABDULLAN et ABDULLAN, 1966 (nec FABRICIUS, 1775), Proc. R. Ent. Soc. London, (B)35: 87.

Eutetrappa elegans HAYASHI, 1966 和社緣天牛

HAYASHI, 1966, Bull. Osaka Jonan Women's Jr. Coll., 1: 9, f. 6 (Hosakei).

Distr.: Taiwan.

Genus *Saperda* FABRICIUS, 1775 多星天牛屬

Saperda FABRICIUS, 1775, Syst. Ent., p. 184 (Type-species: *Cerambyx scalaris* LINNÉ, 1758).

Saperda kojimai MAKIHARA et NAKAMURA, 1985 小島氏黑肩天牛

MAKIHARA et NAKAMURA, 1985, Mis. Rep. Hiwa Mus. Nat. Hist., 23: 18 (Huanshan).
Distr.: Taiwan.

Tribe Gleneini 白星天牛族

Genus *Paraglenea* BATES, 1866 苧麻天牛屬

Paraglenea BATES, 1886, Proc. Zool. Soc. London, p. 352 (Type-species: *Glenea fortunei* SAUNDERS, 1853).

Paraglenea swinhoei BATES, 1866 黑紋蒼藍天牛

BATES, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 352, f. 3 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

P. fortunei (SAUNDERS, 1853) 苧麻天牛

SAUNDERS, Trans. Ent. Soc. London, (2)2: 112, pl. 4, f. 1 (*Glenea*) (N. China).

chloromelas THOMSON, 1879, Revue Mag. Zool., (3)7: 21 (*Glenea*) (China).

Distr.: Taiwan; Japan, China, Tonkin.

Genus *Pareutetrappa* BREUNING, 1952 蒼藍天牛屬

Pareutetrappa BREUNING, 1952, Ent. Arb. Mus. Georg. Frey, 3: 135 (Type-species: *P. eximia* BATES, 1884).

Pareutetrappa magnifica (SCHWARZER, 1925)

SCHWARZER, 1925, Ent. Bl. Biol. Syst. Kafer, 21: 148 (*Saperda*) (Kosempo).

Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

subsp. *magnifica* (SCHWARZER, 1925) s. str. 胸紋蒼藍天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Bl. Biol. Syst. Kafer, 21: 148 (*Saperda*) (Kosempo).

Distr.: Taiwan.

Genus *Glenea* NEWMAN, 1842 白星天牛屬

Glenea NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 301 (n. n. pro. *Sphenura* CASTELNAU, 1840).

Sphenura CASTELNAU, 1840, Hist. Nat. Ins., Gen. Col., 2: 489 (Type-species: *S. novembuttata* GUERIN, 1831).

Glenea anulicornia SCHWARZER, 1925 新島氏黃條天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 149 (Kankau).

niijimai MATSUSHITA, 1938, Kontyû, 12: 94 (*G. (Macroglenea)*) (Hori).

Distr.: Taiwan.

G. subabbreviata BREUNING, 1956 武界黃條天牛

BREUNING, 1956, Ent. Arb., 7: 791 (n. n. for *G. abbreviata* GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 573) (Bukai).

Distr.: Taiwan.

- G. acutoides* SCHWARZER, 1925 環紋黃條天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 151 (Kosempo).
obliqua GRESSITT, 1939, Notes d'Ent. Chinoise, 6: 119, pl. 2, f. 9-11 (China).
roubali HEYROVSKY, 1939, Casopis C. Spo. Ent., 36: 68 (China).
 Distr.: Taiwan; China.
- G. centroguttata* FAIRMAIRE, 1897 一色氏黃紋天牛
 FAIRMAIRE, 1897, Notes Leyden Mus., 19: 232 (Tibet).
issikii MITONO, 1934, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 24: 490, f. 1 (Shinchiku:
 Shiigao, Toryo, Doka, Kahodai & Piyasan).
 Distr.: Taiwan; Japan, W. China.
- G. chlorospila* GAHAN, 1897 琉球藍星天牛
 GAHAN, 1897, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)19: 488 (Japan (Ryukyu Is.)).
 Distr.: Taiwan; Japan.
- G. chrysomaculata* SCHWARZER, 1925 藍艷燦星天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 152 (Sokutsu, Alikang, Kosempo).
 Distr.: Taiwan.
- G. chujoi* MITONO, 1937 桑黃紋天牛
 MITONO, 1937, Mushi, 10: 149, f. (Shinchiku: Seto).
 Distr.: Taiwan.
- G. tonkinea* AURIVILLIUS, 1926
 AURIVILLIUS, 1926, Ark. Zool., 18(A9): 19, f. (Tonkin).
 Distr.: Taiwan; Tonkin, Hainan I.
- subsp. *diversenotata* SCHWARZER, 1925 海南白星天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 152 (Kosempo).
 Distr.: Taiwan.
- G. fainanensis* PIC, 1916 曇斑條天牛
 PIC, 1916, Mat. Long., 10, 1: 17 (Fainan).
horishana MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 412 (Hori).
pieliana subsp. *nigra* GRESSITT, 1940, Notes d'Ent. Chinoise, 7: 194, pl. 5, f. 5
 (China).
 Distr.: Taiwan.
- G. iwasakii* KANO, 1933 岩崎氏金條天牛
 KANO, 1933, Kontyû, 7: 139 (Japan (Ryukyu Is.)).
stolata MATSUMURA et MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agri. Hokkaido Univ., 34: 413,
 f. 7 (Japan (Ryukyu Is.)).
 Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).
- G. lacteomaculata* SCHWARZER, 1925 白紋星天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 151 (Kosempo, Sokutsu).
 Distr.: Taiwan.
- G. sauteri* SCHWARZER, 1925 曹太氏黃紋天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 150 (Fuhosho, Alikang, Kosempo).
 Distr.: Taiwan; Japan (Ryukyu Is.).

- G. luteicollis* GRESSITT, 1935 黃胸欠紋天牛
 GRESSITT, 1935, Philip. J. Sci., 57: 190 (Hassenzan).
 Distr.: Taiwan.
- G. mitonoana* GRESSITT, 1951 藍星黃紋天牛
 GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 576 (n. n.)
issikii var. *ornata* MITONO (nec GAHAN, 1889), 1934, Trans. Nat. Hist. Soc.
 Formosa, 24: 491, f. 2 (Karenko).
 Distr.: Taiwan.
- G. miwai* MITONO, 1943
 MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 38: 585, f. 3 (Baibara, Seto,
 Chushinron).
 Distr.: Taiwan; China.
- subsp. *miwai* MITONO, 1943, s. str. 三輪氏錨紋天牛
 MITONO, 1943, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 38: 585, f. 3 (Baibara, Seto,
 Chushinron).
 Distr.: Taiwan.
- G. relictata* PASCOE, 1868
 PASCOE, 1868, Trans. Ent. Soc. London, (2)4: 258 (China).
 Distr.: Taiwan; Japan, Saghalien, China, Korea, Assam, Hainan I., Tonkin.
- subsp. *silhetica* PLAVILSTCHIKOV, 1927 褐肩白星天牛
 PLAVILSTCHIKOV, 1927, Encyc. Ent. B. Col. 2, 2: 63 (n. n.).
assimilis GAHAN (nec JORDAN), 1897, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)19: 494 (Assam)
 Distr.: Taiwan; Assam, China, Hainan I.
- subsp. *formosensis* BREUNING, 1960 臺灣褐肩白星天牛
 BREUNING, 1960, Abh. Mus. Tierk. Dresden (Ent.), 25: 15.
 Distr.: Taiwan.
- G. versuta* NEWMAN, 1842 蘭嶼白條天牛
 NEWMAN, 1842, Entomologist, 1: 302 (Philippines).
 Distr.: Taiwan (Lanyu Is.) (?); Philippines.
- G. formosana* SCHWARZER, 1925 蓬萊白條天牛
 SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 150 (Kankau).
 Distr.: Taiwan.
- G. mounieri* PIC, 1926
 PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 47: 22 (Annam).
 Distr.: Taiwan; Annam, Tonkin, Laos.
- subsp. *horiensis* BREUNING, 1953 莫尼氏天牛
 BREUNING, 1953, Bull. Inst. Sci Nat. Belg., 29(8): 21 (Hori).
 Distr.: Taiwan.
- G. nanshanchiana* HAYASHI, 1978 南山白條天牛
 HAYASHI, 1978, Ent. Rev. Japan, 31(1/2): 89 (Nanshanchi).
 Distr.: Taiwan.

Genus *Heteroglenea* GAHAN, 1897 長白條天牛屬

Heteroglenea GAHAN, 1897, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)19: 490 (Type-species: *G. glechoma* PASCOE, 1867).

Heteroglenea glechoma (PASCOE, 1867) 長白條天牛

PASCOE, 1867, Trans. Ent. Soc. London, (3)3: 409 (*Matabello*).

Distr.: Taiwan (Lanyu I. (?); Sumatra, Philippines, New Britain, Solomon Is.

Tribe *Phytoeciini* 菊花天牛族Genus *Nupserha* THOMSON, 1869 黑緣蘋果天牛屬

Nupserha THOMSON, 1860, Classif. Ceramb., p. 41 (Type-species: *Stibara cosmopolita* THOMSON, 1857).

Nupserha clypealis (FAIRMAIRE, 1895)

FAIRMAIRE, 1895, Ann. Soc. Ent. Belg., 39: 188 (*Oberea*) (Tonkin).

bisbinotaticollis PIC, 1917, Mat. Longic., 10(2): 13 (*Oberea*).

Distr.: Taiwan; N. Vietnam, China, Laos.

subsp. *formosana* BREUNING, 1960 胸紋蘋果天牛

BREUNING, 1960, Bull. Inst. Sci. Nat. Belg., 36(19): 19.

Distr.: Taiwan.

N. fricator (DALMAN, 1817) 黑尾細蘋果天牛

DALMAN, 1817, in Schonherr, Syn. Ins., 1, 3: 183 (*Saperda*) (Java).

Distr.: Taiwan(?); Burma, Hainan I., Malacca, Java, Borneo, Celebes.

N. kankauensis (SCHWARZER, 1925) 港口姬蘋果天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 153 (*Oberea marginella* var.) (Kankau).

Distr.: Taiwan; Hainan I., S. China.

Genus *Eumecocera* SOLSKY, 1871 偽蘋果天牛屬

Eumecocera SOLSKY, 1871, Hor. Soc. Ent. Ross., 7: 391 (Type-species: *Saperda impustulata* MOTSCHULSKY, 1860).

Eumecocera lineata (GRESSITT, 1951) 四條藍天牛

GRESSITT, 1951, Longicornia, 2: 609, pl. 21, f. 8 (*Stenostola*) (China).

Distr.: Taiwan; China.

Genus *Obereopsis* CHEVROLAT, 1885 巨眼蘋果天牛屬

CHEVROLAT, 1855, Rev. Zool. Ser. 2, 7: 289 (Type-species: *O. obscuritarsis* CHEVROLAT, 1855).

Paroberea KOLBE, 1893, Stett. Ent. Ztg., 54: 79.

Obereopsis bicoloripes (PIC, 1916) 黑尾黃翅蘋果天牛

PIC, 1916, Mat. Long., 10, 1: 16 (*Oberea*) (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

O. lineaticeps (PIC, 1911) 背條蘋果天牛

PIC, 1911, Mat. Long., 8, 1: 21 (*Oberea*) (Taiwan).

Distr.: Taiwan; E. China.

O. signalicornis (MATSUSHITA, 1933) 環紋蘋果天牛

MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 423, pl. 4, f. 10 (*Oberea*)
(Kanko).

Distr.: Taiwan.

Genus *Dystomorphus* PIC, 1926 寬頭天牛屬

Dystomorphus PIC, 1926, Melang Exot.-Ent., 47: 11 (Type-species: *D. notatus* PIC, 1926).

Dystomorphus esakii HAYASHI, 1974 江崎氏寬頭天牛

HAYASHI, 1974, Ent. Rev. Japan, 27(1/2): 59 (Saramao-Matsumine).

Distr.: Taiwan.

Genus *Oberea* MULSANT, 1926 蘋果天牛屬

Oberea MULSANT, 1839, Col. France Long., p. 192 (Type-species: *Cerambyx oculatus*
LINNÉ, 1758).

Isosceles NEWMAN, 1840, Entomologist, 1: 318.

Amaurostoma MÜLLER, 1906, Wien. Ent. Ztg., 25: 222 (Type-species: *Cerambyx*
erythrocephalus SCHRANK, 1778).

Oberea binotaticollis PIC, 1915 短頸蘋果天牛

PIC, 1915, Melang Exot.-Ent., 13: 13 (Taiwan).

Distr.: Taiwan.

O. formosana PIC, 1911 蓬萊蘋果天牛

PIC, 1911, Mat. Long., 8, 1: 20 (Taiwan).

posticata: KANO (nec GAHAN), 1928, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 18: 126
(Chikuto).

Distr.: Taiwan; S. China, Hainan, Korea.

O. fuscipennis (CHEVROLAT, 1852) 褐翅細蘋果天牛

CHEVROLAT, 1852, Revue Mag. Zool., (2)4: 419 (*Isosceles*) (China).

fulveola BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 390 (Japan).

Distr.: Taiwan; Japan, Korea, China, Hainan I.

O. griseopennis SCHWARZER, 1925 樟灰蘋果天牛

SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 154 (Kankau, Kosempo et Sokutsu).

Distr.: Taiwan.

O. nigriceps (WHITE, 1844) 黑腳蘋果天牛

WHITE, 1844, Ann. Mag. Nat. Hist., 14: 425 (*Saperda* (*Isosceles*)) (Hong Kong).

Distr.: Taiwan(?); S. China, Hainan I.

O. nigriventris BATES, 1873 黑腹細蘋果天牛

BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 390 (Japan).

Distr.: Taiwan; Japan, China, Hainan I., Indo-China, Malaysia.

O. reductesignata PIC, 1916 黑尾蘋果天牛

PIC, 1916, Mat. Long., 10, 1: 17 (Taiwan).

nigriceps; KANO (nec WHITE), 1933, Kontyû, 6: 269 (Hori).

Distr.: Taiwan.

- O. taiwana* MATSUSHITA, 1933 臺灣黑腹蘋果天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 423, pl. 5, f. 11 (Taihorin).
Distr.: Taiwan.
- O. taihokensis* BREUNING, 1961 臺北蘋果天牛
BREUNING, 1961, Frust. Ent., 5(4): 168 (Taihoku).
Distr.: Taiwan.
- O. walkeri* GAHAN, 1894 華克氏蘋果天牛
GAHAN, 1894, Trans. Ent. Soc. London, p. 489 (Hong Kong).
latipennis GRESSITT, 1939, Lingnan Sci. J., 18: 99, 104, pl. 3, f. 9 (*O. latipennis*
forma) (China).
Distr.: Taiwan; China.

Genus *Linda* THOMSON, 1864 長腳蘋果天牛屬

- Linda* THOMSON, 1964, Syst. Ceramb., pp. 122, 400 (Type-species: *Amphionycha femorata* CHEVROLAT, 1852).
- Miocris* FAIRMAIRE, 1902, Bull. Soc. Ent. France, p. 245 (Type-species: *M. nigroscutatus* FAIRMAIRE, 1902).
- Linda annulicornis* MATSUSHITA, 1933 環紋黃胸蘋果天牛
MATSUSHITA, 1933, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ., 34: 424, pl. 5, f. 14 (Kagi).
Distr.: Taiwan; S. & SE. China.
- L. femorata* (CHEVROLAT, 1852) 粗腿蘋果天牛
CHEVROLAT, 1852, Revue Zool., (2)4: 418 (*Amphionycha*) (China).
Distr.: Taiwan; China.
- L. fraterna* (CHEVROLAT, 1852) 長角蘋果天牛
CHEVROLAT, 1852, Revue Zool., (2)4: 419 (*Amphionycha*) (China).
Distr.: Taiwan(?); China.
- L. signaticornis* SCHWARZER, 1925 紅胸黑翅蘋果天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 154 (Kosempo, Kankau et Sokutsu).
Distr.: Taiwan.
- L. subannulata* BREUNING 1966 擬環紋蘋果天牛
BREUNING, 1966, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 42(21): 19 (n. n. for *L. subannulicornis* BREUNING et OHBAYASHI, 1964).
Distr.: Taiwan.

Genus *Epiglenea* BATES, 1884 四黃星天牛屬

- Epiglenea* BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 259 (Type-species: *E. comes* BATES, 1884).
- Epiglenea comes* BATES, 1884
BATES, 1884, J. Linn. Soc. London, 18: 259 (Japan).
Distr.: Taiwan; Japan, China, Korea.
- subsp. *formosana* (SCHWARZER, 1925) 蓬萊四星天牛
SCHWARZER, 1925, Ent. Blaett., 21: 153 (*Daphisia formosana*) (Taihorin, Kosempo et Pilam).
Distr.: Taiwan.

Genus *Phytoecia* MULSANT, 1839 菊花天牛屬

Phytoecia MULSANT, 1839, Col. France Long., p. 199 (Type-species: *Cerambyx cylindricus* LINNÉ, 1758).

Phytoecia rufiventris GAUTIER, 1870 菊花天牛

GAUTIER, 1870, Petites. Nouv. Ent., 1: 104 (E. Siberia).

punctigera BLESSIG, 1873, Hor. Soc. Ent. Ross., 9: 226(66) (E. Siberia).

ventralis BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4)12: 388 (China).

abdominalis CHEVROLAT, 1882, Ann. Soc. Ent. France, (6)2: 62.

Distr.: Taiwan; Japan, China, Korea, E. Siberia.

誌 謝

本文承蒙國家科發展委員會計劃經費補助 (NSC 75-0409-B002-47)，得以完成，特此誌謝。

臺灣產天牛科目錄 (II)

粗天牛亞科

中村慎吾 楨原 寬 齊藤明子

朱耀沂 林 匡夫

本篇中列出臺灣產天牛科、粗天牛亞科之種類共 311 種。